

Die Arachniden

Key to the poster of all 1,554 figures

Carl Wilhelm Hahn (vols. 1 and 2, 1831 to 1835) and Carl Ludwig Koch (vols. 3 to 16, 1836 to 1847), *Die Arachniden*. Nuremberg: C. H. Zeh'sche Buchhandlung. 16 volumes with 563 plates. Scans: Biodiversity Heritage Library, doi:10.5962/bhl.title.43744.



koch.kimbaro.com

THE BOOK

Die Arachniden is a 16 volume work on spiders, scorpions, harvestmen, mites and their relatives, with 563 engraved and hand-colored plates. Hahn wrote the first two volumes; Koch wrote the other fourteen. The plates carry 1,554 numbered figures, and many species are still described from them.

THE POSTER

Every figure is on it once, in the order of the animals: spiders first, then whip spiders, scorpions, pseudoscorpions, sun spiders, harvestmen, and mites and ticks. Within each group the families follow a rough evolutionary sequence and the species run alphabetically. Rows and columns are numbered along the edges.

CONTENTS

ARANEAE

1193 figures p. 2

Atypidae	3 p. 2
Ctenizidae	1 p. 2
Halonoproctidae	2 p. 2
Actinopodidae	2 p. 2
Stasimopidae	1 p. 2
Pycnothelidae	1 p. 2
Nemesiidae	2 p. 2
Dipluridae	2 p. 2
Theraphosidae	51 p. 2
Filistatidae	2 p. 2
Scytodidae	1 p. 2
Sicariidae	2 p. 2
Dysderidae	12 p. 2
Segestriidae	8 p. 2
Pholcidae	4 p. 2
Palpimanidae	2 p. 2
Eresidae	20 p. 2
Oecobiidae	6 p. 2
Hersiliidae	1 p. 3
Deinopidae	1 p. 3
Uloboridae	8 p. 3
Titanoecidae	3 p. 3
Zodariidae	3 p. 3
Dictynidae	4 p. 3
Hahniidae	3 p. 3
Cybaeidae	3 p. 3
Argyronetidae	2 p. 3
Amaurobiidae	7 p. 3
Cicurinidae	1 p. 3
Agelenidae	32 p. 3
Theridiidae	71 p. 3
Nesticidae	2 p. 4
Mimetidae	3 p. 4
Tetragnathidae	20 p. 4
Araneidae	183 p. 4
Linyphiidae	78 p. 5
Zoropsidae	1 p. 6
Pisauridae	6 p. 6
Dolomedidae	9 p. 6
Trechaleidae	1 p. 6
Ancylometidae	1 p. 6
Lycosidae	134 p. 6
Oxyopidae	8 p. 7
Ctenidae	4 p. 7
Gnaphosidae	62 p. 7
Trachycosmidae	1 p. 8
Phrurolithidae	4 p. 8

LIOCRANIDAE

3 p. 8

CLUBIONIDAE

18 p. 8

CHEIRACANTHIIDAE

7 p. 8

MITURGIDAE

2 p. 8

CORINNIDAE

9 p. 8

ANYPHAENIDAE

1 p. 8

SELENOPIDAE

1 p. 8

SPARASSIDAE

23 p. 8

PHILODROMIDAE

15 p. 8

THOMISIDAE

62 p. 9

SALTICIDAE

274 p. 9

PEDIPALPI

19 figures p. 11

PHRYNIDAE

9 p. 11

PHRYNICHIDAE

1 p. 11

THELYPHONIDAE

9 p. 11

SCORPIONES

122 figures p. 11

BUTHIDAE

68 p. 11

CHACTIDAE

5 p. 12

EUSCORPIIDAE

24 p. 12

VAEJOVIDAE

7 p. 12

IURIDAE

1 p. 12

BOTHRIURIDAE

1 p. 12

HORMURIDAE

4 p. 12

SCORPIONIDAE

12 p. 12

PSEUDOSCORPIONES

35 figures p. 12

CHTHONIIDAE

3 p. 12

NEOBISIIDAE

9 p. 12

CHEIRIDIIDAE

1 p. 12

CHEARNETIDAE

6 p. 12

CHELIFERIDAE

16 p. 12

SOLIFUGAE

27 figures p. 13

GALEODIDAE

7 p. 13

RHAGODIDAE

3 p. 13

HEXISOPODIDAE

1 p. 13

SOLPUGIDAE

10 p. 13

DAESIIDAE

5 p. 13

AMMOTRECHIDAE

1 p. 13

OPILIONES

144 figures p. 13

TROGULIDAE

12 p. 13

NEMASTOMATIDAE

5 p. 13

ISCHYROPSALIDIDAE

4 p. 13

PHALANGIIDAE

57 p. 13

SCLEROSOMATIDAE

9 p. 13

COSMETIDAE

13 p. 14

GONYLEPTIDAE

41 p. 14

STYGNIDAE

3 p. 14

ACARI

14 figures p. 14

IXODIDAE

2 p. 14

TROMBIDIIDAE

4 p. 14

ERYTHRAEIDAE

2 p. 14

LIMNOCHARIDAE

1 p. 14

HYDRACHNIDAE

5 p. 14

READING THE KEY

Each entry gives the position (row/column on the poster), the current name in italics with its author, and below it Koch's own name, the figure number and the locality he gave. A genus repeated from the entry above is abbreviated.

Click a title in the contents to jump to it; the Contents link at the foot of each page comes back here.

NAMES

Koch's names are given as printed. Current names and families come from the World Spider Catalog, GBIF, the Catalogue of Life and the Scorpion Files.

About 70 names could not be placed and sit in the family of their genus. The page images are cropped from the Biodiversity Heritage Library scans (public domain).

ARANEAE

Atypidae

- 1/1 *Atypus piceus* (Sulzer, 1776)
as *Atypus sulzeri*, Fig. 1547, Südliche Schweiz
- 1/2 *A. piceus* (Sulzer, 1776)
as *Atypus sulzeri*, Fig. 1548, Hiesige Gegend
- 1/3 *A. piceus* (Sulzer, 1776)
as *Atypus sulzeri*, Fig. 88, Deutschland, die Schweiz, Frankreich und Italien

Ctenizidae

- 1/4 *Cyrtocarenum grajum* (C. L. Koch, 1836)
as *Cteniza graja*, Fig. 194, Griechenland

Halonoprotidae

- 1/5 *Cyclocosmia loricata* (C. L. Koch, 1842)
as *Actinopus loricatus*, Fig. 752, Mexico
- 1/6 *Ummidia nidulans* (Fabricius, 1787)
as *Cteniza venatoria*, Fig. 345, Südamerika

Actinopodidae

- 1/7 *Actinopus longipalpis* C. L. Koch, 1842
Fig. 754, Südamerika, Montevideo
- 1/8 *A. tarsalis* Perty, 1833
Fig. 753, Brasilien, Montevideo

Stasimopidae

- 1/9 *Stasimopus caffrus* (C. L. Koch, 1842)
as *Actinopus caffrus*, Fig. 751, Kap der guten Hoffnung

Pycnothelidae

- 1/10 *Stanwellia annulipes* (C. L. Koch, 1841)
as *Mygale annulipes*, Fig. 724, Neu-Holland, Van Diemensland

Nemesiidae

- 1/11 *Brachythele icterica* (C. L. Koch, 1838)
as *Mygale icterica*, Fig. 351, Griechenland
- 1/12 *Nemesia africana* (C. L. Koch, 1838)
as *Cteniza africana*, Fig. 344, Algier

Dipluridae

- 1/13 *Diplura macrura* (C. L. Koch, 1841)
as *Mygale macrura*, Fig. 715, Westindien, von St. Juan
- 1/14 *Trechona venosa* (Latreille, 1832)
as *Mygale zebra*, Fig. 729, Brasilien

Theraphosidae

- 1/15 *Acanthoscurria convexa* (C. L. Koch, 1842)
as *Mygale convexa*, Fig. 750, Unbekannt
- 1/16 *A. geniculata* (C. L. Koch, 1841)
as *Mygale geniculata*, Fig. 718, Amerika
- 1/17 *Aphonopelma rubropilosum* (Ausserer, 1871)
as *Mygale avicularia*, Fig. 737, Südamerika
- 1/18 *Avicularia adusta* (C. L. Koch, 1836)
as *Mygale adusta*, Fig. 192, Brasilien
- 1/19 *A. athletica* (C. L. Koch, 1838)
as *Mygale athletica*, Fig. 348, Westindien
- 1/20 *A. avicularia* (Linnaeus, 1758)
as *Mygale avicularia*, Fig. 75, In allen Ländern des südlichen Amerikas
- 1/21 *A. conformis* (C. L. Koch, 1838)
as *Mygale conformis*, Fig. 349, Westindien
- 1/22 *A. detrita* (C. L. Koch, 1842)
as *Mygale detrita*, Fig. 746, Brasilien
- 1/23 *A. drasiformis* (C. L. Koch, 1842)
as *Mygale drasiformis*, Fig. 734
- 1/24 *A. felina* (C. L. Koch, 1842)
as *Mygale felina*, Fig. 751, Unbekannt
- 1/25 *A. fervida* (C. L. Koch, 1842)
as *Mygale fervida*, Fig. 740, Südamerika, Brasilien
- 1/26 *A. fimbriata* (C. L. Koch, 1841)
as *Mygale fimbriata*, Fig. 722, Brasilien
- 1/27 *A. fusca* (Perty, 1833)
as *Mygale fusca*, Fig. 711, Brasilien
- 1/28 *A. herculea* (C. L. Koch, 1839)
as *Mygale herculea*, Fig. 350, Neuholland
- 1/29 *A. hirsutissima* (C. L. Koch, 1842)
as *Mygale hirsutissima*, Fig. 738, Südamerika
- 1/30 *A. lycosiformis* (C. L. Koch, 1842)
as *Mygale lycosiformis*, Fig. 745, Brasilien
- 1/31 *A. ochracea* (Perty, 1833)
as *Mygale ochracea*, Fig. 721, Brasilien
- 1/32 *A. reichi* (C. L. Koch, 1841)
as *Mygale Reichii*, Fig. 710, Unbekannt
- 1/33 *A. rufidens* (C. L. Koch, 1842)
as *Mygale rufidens*, Fig. 723, Brasilien
- 1/34 *A. scoparia* (C. L. Koch, 1841)
as *Mygale scoparia*, Fig. 725, Brasilien, Para
- 1/35 *A. testacea* (C. L. Koch, 1841)
as *Mygale testacea*, Fig. 719
- 1/36 *A. ursina* (C. L. Koch, 1842)
as *Mygale ursina*, Fig. 749, Noch ungewiss, wahrscheinlich Südamerika
- 1/37 *A. walckenaeri* (Perty, 1833)
as *Mygale Walckenaerii*, Fig. 720, Brasilien
- 2/1 *Caribena laeta* (C. L. Koch, 1842)
as *Mygale laeta*, Fig. 732, Porto-Rico

- 2/2 *Caribena laeta* (C. L. Koch, 1842)
as *Mygale caesia*, Fig. 744, Westindien, Portorico
- 2/3 *Chaetopelma olivaceum* (C. L. Koch, 1841)
as *Mygale olivacea*, Fig. 712
- 2/4 *Cyrtopholis bartholomaei* (Latreille, 1832)
as *Mygale incana*, Fig. 735, St. Thomas
- 2/5 *Ephebopus murinus* (Walckenaer, 1837)
as *Mygale bistriata*, Fig. 347, Brasilien
- 2/6 *Grammostola anthracina* (C. L. Koch, 1842)
as *Mygale anthracina*, Fig. 739, Südamerika, Montevideo
- 2/7 *Harpactira atra* (Latreille, 1832)
as *Mygale coracina*, Fig. 714, Kap der guten Hoffnung
- 2/8 *H. atra* (Latreille, 1832)
as *Mygale funebris*, Fig. 742, Kap der guten Hoffnung
- 2/9 *H. atra* (Latreille, 1832)
as *Mygale funebris*, Fig. 743, Kap der guten Hoffnung
- 2/10 *H. caferriana* (Walckenaer, 1837)
as *Mygale caferriana*, Fig. 741, Kap der guten Hoffnung
- 2/11 *Homoeomma familiare* Bertkau, 1880
as *Mygale versicolor*, Fig. 727, Brasilien; nach Walckenaer auch Guadeloupe und Martinique
- 2/12 *Iridopelma leporina* (C. L. Koch, 1841)
as *Mygale leporina*, Fig. 726, Brasilien, Bahia
- 2/13 *I. plantaris* (C. L. Koch, 1842)
as *Mygale plantaris*, Fig. 736, Brasilien
- 2/14 *Kochiana brunnipes* (C. L. Koch, 1841)
as *Mygale brunnipes*, Fig. 714, Brasilien
- 2/15 *Lasiadora klugii* (C. L. Koch, 1841)
as *Mygale Klugii*, Fig. 708, Brasilien, Bahia
- 2/16 *Phormictopus cancerides* (Latreille, 1806)
as *Mygale cancerides*, Fig. 57, St. Domingo
- 2/17 *P. cancerides* (Latreille, 1806)
as *Mygale Erichsonii*, Fig. 709, St. Domingo, Port au Prince
- 2/18 *P. cancerides* (Latreille, 1806)
as *Mygale cancerides*, Fig. 730, Brasilien
- 2/19 *Phrixotrichus scrofa* (Molina, 1782)
as *Mygale rosea*, Fig. 728, Chili
- 2/20 *Poecilotheria fasciata* (Latreille, 1804)
as *Mygale fasciata*, Fig. 157, Die Insel Ceylon
- 2/21 *P. fasciata* (Latreille, 1804)
as *Mygale fasciata*, Fig. 717, Ostindien, Ceylon
- 2/22 *Selenocosmia javanensis* (Walckenaer, 1837)
as *Mygale monstrosa*, Fig. 346, Java
- 2/23 *S. javanensis* (Walckenaer, 1837)
as *Mygale javanensis*, Fig. 747, Java
- 2/24 *Tapinauchenius plumipes* (C. L. Koch, 1842)
as *Mygale plumipes*, Fig. 733, Surinam
- 2/25 *Theraphosa blondi* (Latreille, 1804)
as *Mygale blondii*, Fig. 22, Cajenne, Insel St. Domingo, Surinam
- 2/26 *T. blondi* (Latreille, 1804)
as *Mygale blondii*, Fig. 748, Südamerika
- 2/27 *Typhochlaena seladonia* (C. L. Koch, 1841)
as *Mygale seladonia*, Fig. 716, Brasilien, Bahia
- 2/28 *Ybyrapora diversipes* (C. L. Koch, 1842)
as *Mygale diversipes*, Fig. 731, Brasilien, Bahia

Filistatidae

- 2/29 *Filistata insidiatrix* (Forsskål, 1775)
as *Teratodes attalicus*, Fig. 343, Griechenland
- 2/30 *Kukulcania hibernalis* (Hentz, 1842)
as *Teratodes depressus*, Fig. 755, Ungewiss, wahrscheinlich Südamerika

Scytodidae

- 2/31 *Scytodes thoracica* (Latreille, 1802)
as *Scytodes tigrina*, Fig. 398, Griechenland

Sicariidae

- 2/32 *Loxosceles rufescens* (Dufour, 1820)
as *Scytodes erythrocephala*, Fig. 399, Die Gegend von Nauplia in Griechenland
- 2/33 *L. rufescens* (Dufour, 1820)
as *Scytodes erythrocephala*, Fig. 400, Die Gegend von Nauplia in Griechenland

Dysderidae

- 2/34 *Dysdera crocata* C. L. Koch, 1838
as *Dysdera crocata*, Fig. 392, Die Halbinsel Morea
- 2/35 *D. crocata* C. L. Koch, 1838
as *Dysdera crocata*, Fig. 393, Die Halbinsel Morea
- 2/36 *D. crocata* C. L. Koch, 1838
as *Dysdera crocata*, Fig. 394, Die Halbinsel Morea
- 2/37 *D. erythrina* (Walckenaer, 1802)
Fig. 3, Südfrankreich und um Paris, auch Deutschland
- 3/1 *D. erythrina* (Walckenaer, 1802)
Fig. 389, Deutschland und Frankreich
- 3/2 *D. punctata* C. L. Koch, 1838
Fig. 395, Griechenland
- 3/3 *D. punctata* C. L. Koch, 1838
Fig. 396, Griechenland
- 3/4 *Harpactea hombergi* (Scopoli, 1763)
as *Dysdera hombergi*, Fig. 819, Deutschland und Frankreich
- 3/5 *H. hombergi* (Scopoli, 1763)
as *Dysdera hombergi*, Fig. 820, Deutschland und Frankreich
- 3/6 *H. lepida* (C. L. Koch, 1838)
as *Dysdera lepida*, Fig. 397, Nähe von Karlsbad in Böhmen

- 3/7 *Harpactea rubicunda* (C. L. Koch, 1838)
as *Dysdera rubicunda*, Fig. 390, Deutschland
- 3/8 *H. rubicunda* (C. L. Koch, 1838)
as *Dysdera rubicunda*, Fig. 391, Deutschland

Segestriidae

- 3/9 *Ariadna bicolor* (Hentz, 1842)
as *Ariadna pallida*, Fig. 817, Nordamerika, Pensylvanien
- 3/10 *Segestria bavarica* C. L. Koch, 1843
Fig. 818
- 3/11 *S. florentina* (Rossi, 1790)
Fig. 1, Südeuropa, Frankreich und Italien
- 3/12 *S. florentina* (Rossi, 1790)
Fig. 385, Italien, das südliche Frankreich, nicht selten in Griechenland
- 3/13 *S. florentina* (Rossi, 1790)
Fig. 386, Italien, das südliche Frankreich, nicht selten in Griechenland
- 3/14 *S. florentina* (Rossi, 1790)
Fig. 387, Italien, das südliche Frankreich, nicht selten in Griechenland
- 3/15 *S. senoculata* (Linnaeus, 1758)
Fig. 2, Ganz Europa
- 3/16 *S. senoculata* (Linnaeus, 1758)
Fig. 388

Pholcidae

- 3/17 *Holocnemus pluchei* (Scopoli, 1763)
as *Pholcus impressus*, Fig. 313, Griechenland
- 3/18 *Pholcus opilionoides* (Schrank, 1781)
as *Pholcus phalangioides*, Fig. 119, Deutschland, Frankreich
- 3/19 *P. opilionoides* (Schrank, 1781)
Fig. 311
- 3/20 *P. phalangioides* (Fuesslin, 1775)
as *Pholcus nemastomoides*, Fig. 312, Griechenland

Palpimanidae

- 3/21 *Palpimanus gibbulus* Dufour, 1820
as *Palpimanus haematinus*, Fig. 178, Griechenland
- 3/22 *P. gibbulus* Dufour, 1820
as *Palpimanus haematinus*, Fig. 179, Griechenland

Eresidae

- 3/23 *Dorceus fastuosus* C. L. Koch, 1846
Fig. 1088, Africa, vom Senegal
- 3/24 *Eresus illustris* C. L. Koch, 1837
Fig. 317, Unbekannt
- 3/25 *E. kollari* Rossi, 1846
as *Eresus 4-guttatus*, Fig. 316, Italien
- 3/26 *E. kollari* Rossi, 1846
as *Eresus cinnaberinus*, Fig. 318, Das südliche Frankreich
- 3/27 *E. kollari* Rossi, 1846
as *Eresus quatuorguttatus*, Fig. 35, Südeuropa
- 3/28 *E. ruficapillus* C. L. Koch, 1846
Fig. 1080, Sicilien
- 3/29 *E. sandaliatus* (Martini & Goetze, 1778)
as *Eresus annulatus*, Fig. 1087, Bayern
- 3/30 *E. sandaliatus* (Martini & Goetze, 1778)
as *Eresus annulatus*, Fig. 36, Bayern
- 3/31 *E. walckenaeri* moerens C. L. Koch, 1846
as *Eresus moerens*, Fig. 1078, Halbinsel Morea in Griechenland
- 3/32 *E. walckenaeri* Brullé, 1832
as *Eresus pruinosus*, Fig. 1079, Griechenland
- 3/33 *E. walckenaeri* Brullé, 1832
as *Eresus ctenizoides*, Fig. 176, Griechenland
- 3/34 *E. walckenaeri* Brullé, 1832
as *Eresus luridus*, Fig. 177, Griechenland
- 3/35 *E. walckenaeri* Brullé, 1832
as *Eresus puniceus*, Fig. 315, Griechenland, Gegend von Nauplia
- 3/36 *Gandanameno fumosa* (C. L. Koch, 1837)
as *Eresus fumosus*, Fig. 314, Afrika
- 3/37 *Stegodyphus dufouri* (Audouin, 1826)
as *Eresus molitor*, Fig. 1082, Aegypten

- 4/1 *S. dufouri* (Audouin, 1826)
as *Eresus semicinctus*, Fig. 1086, Aegypten

- 4/2 *S. lineatus* (Latreille, 1817)
as *Eresus unifasciatus*, Fig. 1081, Südfrankreich

- 4/3 *S. lineatus* (Latreille, 1817)
as *Eresus adpersus*, Fig. 1083, Südeuropa

- 4/4 *S. lineatus* (Latreille, 1817)
as *Eresus fuscifrons*, Fig. 1084, Aegypten

- 4/5 *S. lineatus* (Latreille, 1817)
as *Eresus lituratus*, Fig. 1085, Unterägypten

Oecobiidae

- 4/6 *Uroctea durandi* (Latreille, 1809)
as *Clotho anthracina*, Fig. 1549, Gegend von Fiume
- 4/7 *U. durandi* (Latreille, 1809)
as *Clotho cycaca*, Fig. 812, Italien
- 4/8 *U. durandi* (Latreille, 1809)
as *Clotho goudotii*, Fig. 813, Afrika
- 4/9 *U. durandi* (Latreille, 1809)
as *Clotho guttata*, Fig. 814, Zweifelhaft
- 4/10 *U. durandi* (Latreille, 1809)
as *Clotho stellata*, Fig. 815, Portugal

4/11 *Uroctea limbata* (C. L. Koch, 1843)
as *Clotho limbata*, Fig. 816, Arabien

Hersiliidae

4/12 *Hersilia caudata* Audouin, 1826
Fig. 824, zweifelhaft

Deinopidae

4/13 *Deinopsis cylindracea* C. L. Koch, 1846
as *Deinopsis cylindraceus*, Fig. 1089, Südamerika (Columbien)

Uloboridae

4/14 *Hyptiotes paradoxus* (C. L. Koch, 1834)
as *Mithras paradoxus*, Fig. 1023, Bei Neumarkt

4/15 *H. paradoxus* (C. L. Koch, 1834)
as *Mithras paradoxus*, Fig. 1024, Bei Neumarkt

4/16 *H. paradoxus* (C. L. Koch, 1834)
as *Mithras undulatus*, Fig. 1025

4/17 *Philoponella lunaris* (C. L. Koch, 1839)
as *Tetragnatha lunaris*, Fig. 540, Brasilien

4/18 *Uloborus canescens* C. L. Koch, 1844
Fig. 957, Südamerika, Columbien

4/19 *U. walckenaerius* Latreille, 1806
Fig. 92, Hiesige Nürnberger Gegend

4/20 *U. walckenaerius* Latreille, 1806
Fig. 955, Frankreich und Deutschland

4/21 *U. walckenaerius* Latreille, 1806
Fig. 956, Frankreich und Deutschland

Titanoecidae

4/22 *Titanoeca quadriguttata* (Hahn, 1833)
as *Theridion obscurum*, Fig. 62, Hiesige Umgegend;
Frankreich

4/23 *T. quadriguttata* (Hahn, 1833)
as *Theridion 4-guttatum*, Fig. 63, Gebirgige Gegenden
Frankens

4/24 *T. quadriguttata* (Hahn, 1833)
as *Theridion 4-guttatum*, Fig. 64, Gebirgige Gegenden
Frankens

Zodariidae

4/25 *Zodarion germanicum* (C. L. Koch, 1837)
as *Enyo germanica*, Fig. 809, Deutschland

4/26 *Z. germanicum* (C. L. Koch, 1837)
as *Enyo germanica*, Fig. 810, Deutschland

4/27 *Z. graecum* (C. L. Koch, 1843)
as *Enyo graeca*, Fig. 811, Griechenland

Dictynidae

4/28 *Brigittea latens* (Fabricius, 1775)
as *Dictyna latens*, Fig. 186, Deutschland

4/29 *Dictyna arundinacea* (Linnaeus, 1758)
as *Dictyna benigna*, Fig. 184, Schweden, Deutschland,
Frankreich

4/30 *D. arundinacea* (Linnaeus, 1758)
as *Dictyna benigna*, Fig. 185, Schweden, Deutschland,
Frankreich

4/31 *Nigma flavescens* (Walckenaer, 1830)
as *Dictyna variabilis*, Fig. 187, Bei Regensburg

Hahniiidae

4/32 *Antistea elegans* (Blackwall, 1841)
as *Hahnia pratensis*, Fig. 639, In hiesiger Gegend, und zwar in
den Weintingier Wiesen

4/33 *Hahnia pusilla* C. L. Koch, 1841
Fig. 637, In hiesiger Gegend und in der Oberpfalz

4/34 *H. pusilla* C. L. Koch, 1841
Fig. 638, In hiesiger Gegend und in der Oberpfalz

Cybaeidae

4/35 *Cryphoea silvicola* (C. L. Koch, 1834)
as *Hahnia silvicola*, Fig. 1076, Bisher nur in hiesiger Gegend

4/36 *C. silvicola* (C. L. Koch, 1834)
as *Hahnia silvicola*, Fig. 1077, Bisher nur in hiesiger Gegend

4/37 *Cybaeus tetricus* (C. L. Koch, 1839)
as *Amaurobius tetricus*, Fig. 462, Kärnten

Argyronetidae

5/1 *Argyroneta aquatica* (Clerck, 1757)
Fig. 118, Europa

5/2 *A. aquatica* (Clerck, 1757)
Fig. 636, Fast in ganz Europa

Amaurobiidae

5/3 *Amaurobius fenestralis* (Ström, 1768)
as *Amaurobius atrox*, Fig. 831

5/4 *A. fenestralis* (Ström, 1768)
as *Clubiona atrox*, Fig. 87, Deutschland, Frankreich, Schweden

5/5 *A. ferax* (Walckenaer, 1830)
Fig. 460, Deutschland

5/6 *A. ferax* (Walckenaer, 1830)
Fig. 461, Deutschland

5/7 *Callobius claustrarius* (Hahn, 1833)
as *Amaurobius montanus*, Fig. 465

5/8 *C. claustrarius* (Hahn, 1833)
as *Amaurobius claustrarius*, Fig. 830, Bajern

5/9 *C. claustrarius* (Hahn, 1833)
as *Clubiona claustraria*, Fig. 86, Deutschland

Cicurinidae

5/10 *Cicurina cicur* (Fabricius, 1792)
as *Tegenaria cicurea*, Fig. 620, Deutschland

Agelenidae

5/11 *Agelena labyrinthica* (Clerck, 1757)
as *Agelena labirinthica*, Fig. 150, Fast in allen Ländern Europas

5/12 *A. labyrinthica* (Clerck, 1757)
as *Agelena labirinthica*, Fig. 151, Fast in allen Ländern Europas

5/13 *A. orientalis* C. L. Koch, 1837
Fig. 634, Die Halbinsel Morea

5/14 *A. orientalis* C. L. Koch, 1837
as *Agelena syriaca*, Fig. 827, Syrien

5/15 *Agelenopsis pennsylvanica* (C. L. Koch, 1843)
as *Agelena pensylvanica*, Fig. 828, Nordamerika, Pensylvanien

5/16 *Allagelena gracilens* (C. L. Koch, 1841)
as *Agelena gracilens*, Fig. 635, In hiesiger Gegend

5/17 *Coelotes terrestris* (Wider, 1834)
as *Amaurobius terrestris*, Fig. 463, Bayern und Böhmen,
Gebirgswälder

5/18 *C. terrestris* (Wider, 1834)
as *Amaurobius terrestris*, Fig. 464, Bayern und Böhmen,
Gebirgswälder

5/19 *C. terrestris* (Wider, 1834)
as *Amaurobius roscidus*, Fig. 829, Jenseits der Alpen,
wahrscheinlich Gegend von Triest

5/20 *Eratigena atrica* (C. L. Koch, 1843)
as *Tegenaria atrica*, Fig. 825, Deutschland, wahrscheinlich
mehr in den nördlichen als südlichen Ländern

5/21 *Histopona torpida* (C. L. Koch, 1837)
as *Tetratrix torpida*, Fig. 625, Deutschland

5/22 *H. torpida* (C. L. Koch, 1837)
as *Tetratrix torpida*, Fig. 626, Deutschland

5/23 *Lycosoides coarctata* (Dufour, 1831)
as *Tetratrix ferruginea*, Fig. 627, Die Gegend um Nauplia

5/24 *Maimuna vestita* (C. L. Koch, 1841)
as *Tetratrix vestita*, Fig. 628, Griechenland

5/25 *M. vestita* (C. L. Koch, 1841)
as *Tetratrix vestita*, Fig. 629, Griechenland

5/26 *Tegenaria advena* (C. L. Koch, 1841)
as *Philoica advena*, Fig. 633, Wahrscheinlich jenseits der
deutschen Alpen

5/27 *T. campestris* (C. L. Koch, 1834)
Fig. 615, Deutschland

5/28 *T. campestris* (C. L. Koch, 1834)
Fig. 616, Deutschland

5/29 *T. domestica* (Clerck, 1757)
as *Tegenaria longipes*, Fig. 617, Südliche Schweiz und
Oberitalien

5/30 *T. domestica* (Clerck, 1757)
as *Tegenaria civilis*, Fig. 618, Deutschland und Frankreich

5/31 *T. domestica* (Clerck, 1757)
as *Tegenaria civilis*, Fig. 619, Deutschland und Frankreich

5/32 *T. ferruginea* (Panzer, 1804)
as *Tegenaria domestica*, Fig. 607, Schweden und Deutschland

5/33 *T. ferruginea* (Panzer, 1804)
as *Tegenaria domestica*, Fig. 608, Schweden und Deutschland

5/34 *T. ferruginea* (Panzer, 1804)
as *Tegenaria petrensis*, Fig. 609, Karlsbad in Böhmen

5/35 *T. ferruginea* (Panzer, 1804)
as *Tegenaria stabularia*, Fig. 614, Griechenland

5/36 *T. pagana* C. L. Koch, 1840
Fig. 612, Griechenland, Gegend von Nauplia

5/37 *T. pagana* C. L. Koch, 1840
Fig. 613, Griechenland, Gegend von Nauplia

6/1 *T. parietina* (Fourcroy, 1785)
as *Tegenaria intricata*, Fig. 610, Griechenland

6/2 *T. parietina* (Fourcroy, 1785)
as *Tegenaria intricata*, Fig. 611, Griechenland

6/3 *Tetratrix denticulata* (Olivier, 1789)
as *Tetratrix lycosina*, Fig. 623, Deutschland, auch in Schweden

6/4 *T. denticulata* (Olivier, 1789)
as *Tetratrix lycosina*, Fig. 624, Deutschland, auch in Schweden

6/5 *T. montana* (C. L. Koch, 1834)
Fig. 630, Deutschland

Theridiidae

6/6 *Anelosimus vittatus* (C. L. Koch, 1836)
as *Theridion vittatum*, Fig. 217, Bei Regensburg

6/7 *A. vittatus* (C.L.Koch, 1836)
as *Theridium vittatum*, Fig. 326

6/8 *Asagena phalerata* (Panzer, 1800)
as *Phrurolithus pallipes*, Fig. 1026, Bayern, die Gegend von
Regensburg

6/9 *A. phalerata* (Panzer, 1800)
as *Asagena serratipes*, Fig. 502, Deutschland, Frankreich,
Schweden

6/10 *A. phalerata* (Panzer, 1800)
as *Asagena serratipes*, Fig. 503, Deutschland, Frankreich,
Schweden

6/11 *A. phalerata* (Panzer, 1800)
as *Theridion 4-signatum*, Fig. 60, Hiesige Gegend, auch um
Erlangen und Muggendorf

6/12 *Crustulina guttata* (Wider, 1834)
as *Theridium guttatum*, Fig. 651, Deutschland

6/13 *Crustulina guttata* (Wider, 1834)
as *Theridium guttatum*, Fig. 652, Deutschland

6/14 *Cryptachaea riparia* (Blackwall, 1834)
as *Theridium saxatile*, Fig. 324, Die Gegend von Regensburg

6/15 *C. riparia* (Blackwall, 1834)
as *Theridium saxatile*, Fig. 325, Die Gegend von Regensburg

6/16 *Diploena braccata* (C. L. Koch, 1841)
as *Theridium braccatum*, Fig. 656, Die Gegend von Karlsbad

6/17 *D. melanogaster* (C. L. Koch, 1837)
as *Atea melanogaster*, Fig. 941, Deutschland

6/18 *D. melanogaster* (C. L. Koch, 1837)
as *Atea melanogaster*, Fig. 942, Deutschland

6/19 *Enoplognatha ovata* (Clerck, 1757)
as *Theridion redimitum*, Fig. 1053

6/20 *E. ovata* (Clerck, 1757)
as *Theridion redimitum*, Fig. 1054

6/21 *E. ovata* (Clerck, 1757)
as *Theridion redimitum*, Fig. 1055

6/22 *E. ovata* (Clerck, 1757)
as *Theridion redimitum*, Fig. 65, Allenthalben, beinahe in allen
Ländern Europas

6/23 *E. thoracica* (Hahn, 1833)
as *Theridion thoracicum*, Fig. 66, Hiesige Nürnberger Gegend

6/24 *Episinus truncatus* Latreille, 1809
Fig. 958, Donauthal der hiesigen Gegend

6/25 *E. truncatus* Latreille, 1809
Fig. 959, Donauthal der hiesigen Gegend

6/26 *Euryopsis flavomaculata* (C. L. Koch, 1836)
as *Micryphantes flavomaculatus*, Fig. 220, Bei Regensburg, in
Wäldern

6/27 *Kochiura aulica* (C.L.Koch, 1838)
as *Theridium aulicum*, Fig. 323, Griechenland

6/28 *Lasaeola coracina* (C. L. Koch, 1837)
as *Theridium coracinum*, Fig. 655, Die hiesige Gegend

6/29 *L. tristis* (Hahn, 1833)
as *Theridium triste*, Fig. 653, Deutschland

6/30 *L. tristis* (Hahn, 1833)
as *Theridium triste*, Fig. 654, Deutschland

6/31 *L. tristis* (Hahn, 1833)
as *Theridion triste*, Fig. 67, Umgebungen von Nürnberg

6/32 *Latrodectus dotatus* C. L. Koch, 1841
Fig. 683, Nordamerika, Pennsylvania

6/33 *L. geometricus* C. L. Koch, 1841
Fig. 684, Südamerika, Columbien

6/34 *L. mactans* (Fabricius, 1775)
as *Meta schuchii*, Fig. 167, Griechenland

6/35 *L. mactans* (Fabricius, 1775)
Fig. 682, Nordamerika, Pennsylvania

6/36 *L. tredecimguttatus* (Rossi, 1790)
as *Meta hispida*, Fig. 166, Griechenland

6/37 *L. tredecimguttatus* (Rossi, 1790)
as *Latrodectus 13-guttatus*, Fig. 273

7/1 *L. tredecimguttatus* (Rossi, 1790)
as *Latrodectus conglobatus*, Fig. 274, Griechenland

7/2 *Neottiura bimaculata* (Linnaeus, 1767)
as *Theridium reticulatum*, Fig. 1059, Die Gegend von
Karlsbad in Böhmen

7/3 *N. bimaculata* (Linnaeus, 1767)
as *Theridion dorsiger*, Fig. 61, Hiesige Nürnberger Gegend

7/4 *Paidiscura pallens* (Blackwall, 1834)
as *Micryphantes hystrius*, Fig. 1074, Baiern

7/5 *Parasteatoda lunata* (Clerck, 1757)
as *Theridion lunatum*, Fig. 1060, Deutschland

7/6 *P. lunata* (Clerck, 1757)
as *Theridion lunatum*, Fig. 1061, Deutschland

7/7 *P. lunata* (Clerck, 1757)
as *Theridium lunatum*, Fig. 645

7/8 *P. tepidarium* (C. L. Koch, 1841)
as *Theridium tepidarium*, Fig. 646, In Glas- und
Treibhäusern

7/9 *P. tepidarium* (C. L. Koch, 1841)
as *Theridium tepidarium*, Fig. 647, In Glas- und
Treibhäusern

7/10 *P. tepidarium* (C. L. Koch, 1841)
as *Theridium tepidarium*, Fig. 648, In Glas- und
Treibhäusern

7/11 *Phylloneta sisyphia* (Clerck, 1757)
as *Theridion sisyphum*, Fig. 132, Europa

7/12 *P. sisyphia* (Clerck, 1757)
as *Theridion nervosum*, Fig. 133, Europa

7/13 *P. sisyphia* (Clerck, 1757)
as *Theridium sisyphus*, Fig. 644

7/14 *Simitridion simile* (C. L. Koch, 1836)
as *Theridion simile*, Fig. 215, Bei Regensburg

7/15 *S. simile* (C. L. Koch, 1836)
as *Theridium simile*, Fig. 649

7/16 *Steatoda albomaculata* (De Geer, 1778)
as *Phrurolithus corollatus*, Fig. 504

7/17 *S. albomaculata* (De Geer, 1778)
as *Phrurolithus corollatus*, Fig. 505

7/18 *S. albomaculata* (De Geer, 1778)
as *Theridion albomaculatum*, Fig. 59, Deutschland, Frankreich
und Schweden

- 7/19** *Steatoda bipunctata* (Linnaeus, 1758)
as Eucharha bipunctata, Fig. 1027, Schweden, Deutschland und Frankreich
- 7/20** *S. bipunctata* (Linnaeus, 1758)
as Phrurolithus ornatus, Fig. 515, Bayern
- 7/21** *S. bipunctata* (Linnaeus, 1758)
as Theridion quadripunctatum, Fig. 58, Beinahe in allen Ländern Europas
- 7/22** *S. castanea* (Clerck, 1757)
as Eucharha castanea, Fig. 1028, Deutschland, nach Clerck auch Schweden
- 7/23** *S. castanea* (Clerck, 1757)
as Eucharha castanea, Fig. 1029, Deutschland, nach Clerck auch Schweden
- 7/24** *S. grossa* (C.L.Koch, 1838)
as Theridium grossum, Fig. 321, Die Halbinsel Morea
- 7/25** *S. paykulliana* (Walckenaer, 1806)
as Phrurolithus hamatus, Fig. 507, Griechenland
- 7/26** *S. paykulliana* (Walckenaer, 1806)
as Phrurolithus hamatus, Fig. 508, Griechenland
- 7/27** *S. paykulliana* (Walckenaer, 1806)
as Phrurolithus lunatus, Fig. 509, Griechenland
- 7/28** *S. paykulliana* (Walckenaer, 1806)
as Phrurolithus erythrocephalus, Fig. 510, Nördliches Afrika
- 7/29** *Theridion pictum* (Walckenaer, 1802)
Fig. 1062, Frankreich, Deutschland
- 7/30** *T. pictum* (Walckenaer, 1802)
Fig. 1063, Frankreich, Deutschland
- 7/31** *T. pictum* (Walckenaer, 1802)
Fig. 68, Deutschland; Frankreich (nach Walckenaer)
- 7/32** *T. tenellum* C. L. Koch, 1841
as Theridium tenellum, Fig. 650, Griechenland
- 7/33** *T. varians* Hahn, 1833
Fig. 1056
- 7/34** *T. varians* Hahn, 1833
Fig. 1057
- 7/35** *T. varians* Hahn, 1833
Fig. 1058
- 7/36** *T. varians* Hahn, 1833
Fig. 71, Hiesige Gegend
- 7/37** *T. varians* Hahn, 1833
Fig. 72, Hiesige Gegend
- 8/1** *Theridium irroratum*
family placed by genus, Fig. 327, In hiesiger Gegend
- 8/2** *T. venustissimum*
family placed by genus, Fig. 322, Die Halbinsel Morea

Nesticidae

- 8/3** *Nesticus cellulanus* (Clerck, 1757)
as Meta cellulana, Fig. 691, Deutschland, hiesige Gegend (trockene Keller)
- 8/4** *N. cellulanus* (Clerck, 1757)
as Meta cellulana, Fig. 692, Deutschland, hiesige Gegend (trockene Keller)

Mimetidae

- 8/5** *Ero aphana* (Walckenaer, 1802)
as Ero atomaria, Fig. 1033
- 8/6** *E. tuberculata* (De Geer, 1778)
Fig. 1034
- 8/7** *Gelanor zonatus* (C. L. Koch, 1845)
as Galena zonata, Fig. 1032, Ungewiss, wahrscheinlich Egypten

Tetragnathidae

- 8/8** *Leucauge argyra* (Walckenaer, 1841)
as Linyphia aurulenta, Fig. 1049, St. Thomas
- 8/9** *Meta menardi* (Latreille, 1804)
as Meta fusca, Fig. 685, Schweden, Deutschland, Frankreich
- 8/10** *M. menardi* (Latreille, 1804)
as Meta fusca, Fig. 686, Schweden, Deutschland, Frankreich
- 8/11** *M. menardi* (Latreille, 1804)
as Meta fusca, Fig. 687, Schweden, Deutschland, Frankreich
- 8/12** *Metellina merianae* (Scopoli, 1763)
as Meta merianae, Fig. 688, Deutschland, hiesige Gegend (Keller)
- 8/13** *M. merianae* (Scopoli, 1763)
as Meta merianae, Fig. 689, Deutschland, hiesige Gegend (Keller)
- 8/14** *M. merianae* (Scopoli, 1763)
as Meta merianae, Fig. 690, Deutschland, hiesige Gegend (Keller)
- 8/15** *M. merianae* (Scopoli, 1763)
as Meta muraria, Fig. 693, Hiesige Gegend (Stadtmauer)
- 8/16** *M. merianae* (Scopoli, 1763)
as Meta muraria, Fig. 694, Hiesige Gegend (Stadtmauer)
- 8/17** *M. segmentata* (Clerck, 1757)
as Zilla reticulata, Fig. 532, Schweden, Deutschland und Frankreich
- 8/18** *M. segmentata* (Clerck, 1757)
as Zilla reticulata, Fig. 533, Schweden, Deutschland und Frankreich
- 8/19** *Pachygnatha clercki* Sundevall, 1823
as Pachygnatha listeri, Fig. 1064
- 8/20** *P. clercki* Sundevall, 1823
as Theridion maxillosum, Fig. 122, Hiesige Nürnberger Gegend
- 8/21** *Pachygnatha degeeri* Sundevall, 1830
Fig. 1065, Deutschland, Schweden, Frankreich
- 8/22** *P. degeeri* Sundevall, 1830
as Pachygnatha clerckii, Fig. 1067, Schweden, Deutschland
- 8/23** *P. degeeri* Sundevall, 1830
as Theridion vernalis, Fig. 123, Deutschland
- 8/24** *P. tristriata* C. L. Koch, 1845
Fig. 1066, Nordamerika, Pennsylvanien
- 8/25** *P. xanthostoma* C. L. Koch, 1845
Fig. 1068, Pennsylvanien
- 8/26** *P. xanthostoma* C. L. Koch, 1845
Fig. 1069, Pennsylvanien
- 8/27** *Tetragnatha extensa* (Linnaeus, 1758)
Fig. 129, In allen Ländern Europa's

Araneidae

- 8/28** *Acrosoma aculeatum*
family placed by genus, Fig. 211, Amerika
- 8/29** *Aculepeira armida* (Audouin, 1826)
as Miranda hirsuta, Fig. 1550, Italien
- 8/30** *A. armida* (Audouin, 1826)
as Epeira hirsuta, Fig. 9, Italien
- 8/31** *A. armida* (Audouin, 1826)
as Miranda exornata, Fig. 952, Ungarn
- 8/32** *A. ceropegia* (Walckenaer, 1802)
as Epeira scolopetaria, Fig. 131, Nürnberger Umgegend
- 8/33** *A. ceropegia* (Walckenaer, 1802)
as Miranda ceropegia, Fig. 370
- 8/34** *Agalenatea redii* (Scopoli, 1763)
as Epeira agalena, Fig. 115, Deutschland, Schweden, Frankreich
- 8/35** *A. redii* (Scopoli, 1763)
as Atea scolopetaria, Fig. 934, Schweden, Deutschland, Frankreich
- 8/36** *A. redii* (Scopoli, 1763)
as Atea scolopetaria, Fig. 935, Schweden, Deutschland, Frankreich
- 8/37** *Araneus alsine* (Walckenaer, 1802)
as Epeira bohemia, Fig. 376, Die Gegend von Karlsbad in Böhmen
- 9/1** *A. alsine* (Walckenaer, 1802)
as Epeira lutea, Fig. 378, Oberpfälzischer Bruckerforst
- 9/2** *A. alsine* (Walckenaer, 1802)
as Epeira lutea, Fig. 926, Oberpfalz (Bayern), auch bei Erlangen
- 9/3** *A. alsine* (Walckenaer, 1802)
as Epeira lutea, Fig. 927, Oberpfalz (Bayern), auch bei Erlangen
- 9/4** *A. angulatus* Clerck, 1757
as Epeira angulata, Fig. 108, Fast in allen Ländern Europas
- 9/5** *A. angulatus* Clerck, 1757
as Epeira angulata, Fig. 892, Schweden, Deutschland, Frankreich
- 9/6** *A. angulatus* Clerck, 1757
as Epeira angulata, Fig. 893, Schweden, Deutschland, Frankreich
- 9/7** *A. angulatus* Clerck, 1757
as Epeira pinetorum, Fig. 904, hirsiger Gegend
- 9/8** *A. angulatus* Clerck, 1757
as Epeira pinetorum, Fig. 905, hirsiger Gegend
- 9/9** *A. circe* (Audouin, 1826)
as Epeira schreibersii, Fig. 109, Dalmatien
- 9/10** *A. circe* (Audouin, 1826)
as Epeira gislui, Fig. 898, Deutschland, südlich der Alpen
- 9/11** *A. circe* (Audouin, 1826)
as Epeira regia, Fig. 899, Deutschland jenseits der Alpen, Italien, Frankreich
- 9/12** *A. circe* (Audouin, 1826)
as Epeira schreibersii, Fig. 900, Griechenland, Spanien, Dalmatien
- 9/13** *A. circe* (Audouin, 1826)
as Epeira schreibersii, Fig. 901, Griechenland, Spanien, Dalmatien
- 9/14** *A. diadematus* Clerck, 1757
as Epeira diademata, Fig. 110, In allen Ländern Europas
- 9/15** *A. diadematus* Clerck, 1757
as Epeira diadematus, Fig. 910
- 9/16** *A. diadematus* Clerck, 1757
as Epeira stellata, Fig. 911, Alpengegenden (Rathhausberg im Salzburgerischen)
- 9/17** *A. grossus* (C. L. Koch, 1844)
as Epeira grossa, Fig. 896, Wien; Ungarn (Banat); Deutschland jenseits der Alpen
- 9/18** *A. grossus* (C. L. Koch, 1844)
as Epeira grossa, Fig. 897, Wien; Ungarn (Banat); Deutschland jenseits der Alpen
- 9/19** *A. hirtipes* (Fabricius, 1787)
as Mygalc hirtipes, Fig. 193, Brasilien
- 9/20** *A. incertus* (C. L. Koch, 1843)
as Atea incerta, Fig. 822, Ungewisse wahrscheinlich Ostindien
- 9/21** *A. marmoreus* Clerck, 1757
as Epeira scalaris, Fig. 114, Europa
- 9/22** *A. marmoreus* Clerck, 1757
as Epeira bohemia, Fig. 377, Die Gegend von Karlsbad in Böhmen
- 9/23** *A. marmoreus* Clerck, 1757
as Epeira marmorea, Fig. 379, [unlesbar] und Deutschland
- 9/24** *Araneus marmoreus* Clerck, 1757
as Epeira marmorea, Fig. 380, [unlesbar] und Deutschland
- 9/25** *A. marmoreus* Clerck, 1757
as Epeira pyramidata, Fig. 912
- 9/26** *A. marmoreus* Clerck, 1757
as Epeira jenisoni, Fig. 928, Deutschland, südlich der Alpen
- 9/27** *A. marmoreus* Clerck, 1757
as Epeira jenisoni, Fig. 929, Deutschland, südlich der Alpen
- 9/28** *A. nordmanni* (Thorell, 1870)
as Epeira angulata, Fig. 894, Schweden, Deutschland, Frankreich
- 9/29** *A. nordmanni* (Thorell, 1870)
as Epeira angulata, Fig. 895, Schweden, Deutschland, Frankreich
- 9/30** *A. pulcherrimus* (Roewer, 1942)
as Epeira pulchra, Fig. 908, Deutschland, südlich der Alpen
- 9/31** *A. quadratus* Clerck, 1757
as Epeira quadrata, Fig. 381, Schweden, Deutschland und Frankreich
- 9/32** *A. quadratus* Clerck, 1757
as Epeira quadrata, Fig. 382, Schweden, Deutschland und Frankreich
- 9/33** *A. sturmi* (Hahn, 1831)
as Epeira sturmi, Fig. 8, Hiesige Gegend
- 9/34** *A. sturmi* (Hahn, 1831)
as Epeira alpina, Fig. 924, Frankreich, südliches Deutschland jenseits der Alpen
- 9/35** *A. sturmi* (Hahn, 1831)
as Epeira alpina, Fig. 925, Frankreich, südliches Deutschland jenseits der Alpen
- 9/36** *A. sturmi* (Hahn, 1831)
as Atea agalena, Fig. 936, Deutschland
- 9/37** *A. sturmi* (Hahn, 1831)
as Atea agalena, Fig. 937, Deutschland
- 10/1** *A. sturmi* (Hahn, 1831)
as Atea agalena, Fig. 938, Deutschland
- 10/2** *A. triguttatus* (Fabricius, 1775)
as Atea aurantiaca, Fig. 940, Bayern, bisher nur bei Regensburg und Erlangen
- 10/3** *A. venatrix* (C. L. Koch, 1838)
as Miranda venatrix, Fig. 373, Brasilien
- 10/4** *A. venatrix* (C. L. Koch, 1838)
as Epeira analis, Fig. 891, Brasilien
- 10/5** *A. vulpinus* (Hahn, 1834)
as Epeira vulpina, Fig. 111, Gegend um Neapel
- 10/6** *Araniella cucurbitina* (Clerck, 1757)
as Miranda cucurbitina, Fig. 371, Fast in ganz Europa
- 10/7** *A. cucurbitina* (Clerck, 1757)
as Miranda cucurbitina, Fig. 372, Fast in ganz Europa
- 10/8** *Argiope argentata* (Fabricius, 1775)
as Argiope argentatus, Fig. 360, Südamerika
- 10/9** *A. argentata* (Fabricius, 1775)
as Argiope fenestrinus, Fig. 361, Südamerika
- 10/10** *A. aurantia* Lucas, 1833
as Nephila vestita, Fig. 358, Unbekannt
- 10/11** *A. australis* (Walckenaer, 1805)
as Argiope clathratus, Fig. 362, Afrika
- 10/12** *A. bruennichi* (Scopoli, 1772)
as Nephila transalpina, Fig. 356, Im südlichen Deutschland
- 10/13** *A. bruennichi* (Scopoli, 1772)
as Nephila transalpina, Fig. 357, Im südlichen Deutschland
- 10/14** *A. bruennichi* (Scopoli, 1772)
as Nephila fasciata, Fig. 954, Frankreich; auch Deutschland, aber sehr selten
- 10/15** *A. lobata* (Pallas, 1772)
as Argiope praelatus, Fig. 359, Die Gegenden des Balkan
- 10/16** *A. lobata*
as Epeira sericea, Fig. 4, Südliches Frankreich und Italien
- 10/17** *Caerostris sexcuspida* (Fabricius, 1793)
as Gasteracantha sexcuspida, Fig. 271, Afrika
- 10/18** *Cyclosa conica* (Pallas, 1772)
as Epeira conica, Fig. 130, Fast alle Gegenden Europas
- 10/19** *C. conica* (Pallas, 1772)
as Singa conica, Fig. 943
- 10/20** *C. conica* (Pallas, 1772)
as Singa conica, Fig. 944
- 10/21** *C. conica* (Pallas, 1772)
as Singa conica, Fig. 945
- 10/22** *Eriophora fuliginea* (C. L. Koch, 1838)
as Epeira fuliginea, Fig. 375, Brasilien
- 10/23** *E. fuliginea* (C. L. Koch, 1838)
as Epeira hispida, Fig. 889, Brasilien
- 10/24** *E. ravilla* (C. L. Koch, 1844)
as Epeira ravilla, Fig. 890, Mexico
- 10/25** *Eustala gonygaster* (C. L. Koch, 1838)
as Argiope gonygaster, Fig. 365, Brasilien
- 10/26** *E. tridentata* (C. L. Koch, 1838)
as Argiope tridentatus, Fig. 363, Brasilien
- 10/27** *E. tridentata* (C. L. Koch, 1838)
as Argiope tridentatus, Fig. 364, Brasilien
- 10/28** *Gasteracantha cancriformis* (Linnaeus, 1758)
as Acrosoma hexacantha, Fig. 106, Brasilien
- 10/29** *G. cancriformis* (Linnaeus, 1758)
Fig. 263, Amerika

- 10/30** *Gasteracantha cancriformis* (Linnaeus, 1758)
as *Gasteracantha hexacantha*, Fig. 268, Brasilien
- 10/31** *G. cancriformis* (Linnaeus, 1758)
as *Gasteracantha velitaris*, Fig. 269, Brasilien
- 10/32** *G. cancriformis* (Linnaeus, 1758)
as *Gasteracantha rubiginosa*, Fig. 878, Westindien, St. Domingo
- 10/33** *G. cancriformis* (Linnaeus, 1758)
as *Gasteracantha mammosa*, Fig. 879, Brasilien
- 10/34** *G. cancriformis* (Linnaeus, 1758)
as *Gasteracantha quadridens*, Fig. 880, Westindien, St. Thomas
- 10/35** *G. cancriformis* (Linnaeus, 1758)
as *Gasteracantha pallida*, Fig. 881
- 10/36** *G. cancriformis* (Linnaeus, 1758)
as *Gasteracantha picea*, Fig. 882, Brasilien
- 10/37** *G. diardi* (Lucas, 1835)
as *Gasteracantha fornicata*, Fig. 261, Java
- 11/1** *G. diardi* (Lucas, 1835)
as *Gasteracantha obliqua*, Fig. 884
- 11/2** *G. geminata* (Fabricius, 1798)
Fig. 260, Ostindien
- 11/3** *G. hecata* (Walckenaer, 1841)
as *Gasteracantha falcifera*, Fig. 883, Ostindien, Manila
- 11/4** *G. kuhli* C. L. Koch, 1837
as *Gasteracantha kuhlii*, Fig. 262, Java
- 11/5** *G. kuhli* C. L. Koch, 1837
as *Gasteracantha annulipes*, Fig. 876, Ostindien, von der Insel Manila
- 11/6** *G. sanguinolenta* C. L. Koch, 1844
Fig. 875, Das Cap der guten Hoffnung
- 11/7** *G. transversa* C. L. Koch, 1837
Fig. 259
- 11/8** *Gea spinipes* C. L. Koch, 1843
Fig. 823, Ostindien, Puloloz
- 11/9** *Gibbaranea bituberculata* (Walckenaer, 1802)
as *Epeira dromedaria*, Fig. 906, Deutschland und Frankreich, bei Regensburg
- 11/10** *G. bituberculata* (Walckenaer, 1802)
as *Epeira dromedaria*, Fig. 907, Deutschland und Frankreich, bei Regensburg
- 11/11** *G. gibbosa* (Walckenaer, 1802)
as *Epeira bicornis*, Fig. 902, Deutschland und Frankreich
- 11/12** *G. gibbosa* (Walckenaer, 1802)
as *Epeira bicornis*, Fig. 903, Deutschland und Frankreich
- 11/13** *G. ulrichi* (Hahn, 1835)
as *Epeira ulrichii*, Fig. 159, Hiesige Gegend
- 11/14** *Hypognatha scutata* (Perty, 1833)
as *Eurysoma scutatium*, Fig. 517, Brasilien
- 11/15** *Hyposinga heri* (Hahn, 1831)
as *Epeira herii*, Fig. 5, Hiesige Gegend (um Nürnberg)
- 11/16** *H. heri* (Hahn, 1831)
as *Singa nigrifrons*, Fig. 949, Gegend von Erlangen
- 11/17** *H. pygmaea* (Sundevall, 1831)
as *Phrurolithus trifasciatus*, Fig. 516, Gegend von Triest
- 11/18** *H. pygmaea* (Sundevall, 1831)
as *Singa trifasciata*, Fig. 948, Gegend von Erlangen
- 11/19** *H. pygmaea* (Sundevall, 1831)
as *Singa anthracina*, Fig. 950, Die hiesige Gegend
- 11/20** *H. sanguinea* (C. L. Koch, 1844)
as *Singa sanguinea*, Fig. 951, Gegend von Erlangen
- 11/21** *Isoxya cicatricosa* (C. L. Koch, 1844)
as *Gasteracantha cicatricosa*, Fig. 877, Kap der guten Hoffnung
- 11/22** *Larinioides cornutus* (Clerck, 1757)
as *Epeira apodisa*, Fig. 116, Alle Länder Europas
- 11/23** *L. cornutus* (Clerck, 1757)
as *Epeira arundinacea*, Fig. 913, ganz Europa, Griechenland
- 11/24** *L. cornutus* (Clerck, 1757)
as *Epeira foliata*, Fig. 920, Nordamerika, Pennsylvanien
- 11/25** *L. cornutus* (Clerck, 1757)
as *Epeira foliata*, Fig. 921, Nordamerika, Pennsylvanien
- 11/26** *L. patagiatus* (Clerck, 1757)
as *Epeira dumetorum*, Fig. 117, In hiesiger Gegend
- 11/27** *L. patagiatus* (Clerck, 1757)
as *Epeira patagiata*, Fig. 916, Deutschland und Schweden
- 11/28** *L. patagiatus* (Clerck, 1757)
as *Epeira patagiata*, Fig. 917, Deutschland und Schweden
- 11/29** *L. patagiatus* (Clerck, 1757)
as *Epeira patagiata*, Fig. 918, Deutschland und Schweden
- 11/30** *L. patagiatus* (Clerck, 1757)
as *Epeira patagiata*, Fig. 919, Deutschland und Schweden
- 11/31** *L. patagiatus* (Clerck, 1757)
as *Epeira nauscosa*, Fig. 922, Deutsche Voralpen, auch höher
- 11/32** *L. patagiatus* (Clerck, 1757)
as *Epeira nauscosa*, Fig. 923, Deutsche Voralpen, auch höher
- 11/33** *L. sclopetarius* (Clerck, 1757)
as *Epeira virgata*, Fig. 113, Hiesige Nürnberger Gegend
- 11/34** *L. sclopetarius* (Clerck, 1757)
as *Epeira sericata*, Fig. 914, sehr verbreitet (Vaterland cross-refers to Hahn vol. 2, p. 27)
- 11/35** *L. sclopetarius* (Clerck, 1757)
as *Epeira sericata*, Fig. 915, sehr verbreitet (Vaterland cross-refers to Hahn vol. 2, p. 27)
- 11/36** *Macracantha arcuata* (Fabricius, 1793)
as *Gasteracantha arcuata*, Fig. 270, Java
- 11/37** *M. basselti* (C. L. Koch, 1837)
as *Gasteracantha hasseltii*, Fig. 267, Java
- 12/1** *Mangora acalypha* (Walckenaer, 1802)
as *Zilla acalypha*, Fig. 530, Deutschland
- 12/2** *M. acalypha* (Walckenaer, 1802)
as *Zilla acalypha*, Fig. 531, Deutschland
- 12/3** *M. acalypha* (Walckenaer, 1802)
as *Epeira genistae*, Fig. 7, Mehrere Orte Deutschlands
- 12/4** *Manogea porracea* (C. L. Koch, 1838)
as *Miranda porracea*, Fig. 368, Brasilien
- 12/5** *Micrathena armigera* (C. L. Koch, 1837)
as *Acrosoma armigerum*, Fig. 257, Brasilien
- 12/6** *M. aureola* (C. L. Koch, 1836)
as *Acrosoma aureolum*, Fig. 213, Brasilien
- 12/7** *M. aureola* (C. L. Koch, 1836)
as *Acrosoma affine*, Fig. 525, Brasilien
- 12/8** *M. chypeata* (Walckenaer, 1805)
Fig. 272, Java
- 12/9** *M. crassispina* (C. L. Koch, 1836)
as *Acrosoma crassispinum*, Fig. 209, Amerika
- 12/10** *M. digitata* (C. L. Koch, 1839)
as *Acrosoma digitatum*, Fig. 523, Brasilien
- 12/11** *M. excavata* (C. L. Koch, 1836)
as *Acrosoma excavatum*, Fig. 227, Brasilien
- 12/12** *M. fissispina* (C. L. Koch, 1836)
as *Acrosoma fissispinum*, Fig. 208, Brasilien
- 12/13** *M. flaveola* (Perty, 1839)
as *Acrosoma flaveolum*, Fig. 522, Brasilien
- 12/14** *M. furcata* (Hahn, 1822)
as *Acrosoma bifurcata*, Fig. 158, Brasilien
- 12/15** *M. furcata* (Hahn, 1822)
as *Acrosoma bifurcatum*, Fig. 521, Brasilien
- 12/16** *M. furcata* (Hahn, 1822)
as *Acrosoma gilvulum*, Fig. 886, Brasilien
- 12/17** *M. gracilis* (Walckenaer, 1805)
as *Acrosoma matronale*, Fig. 887, Mexico
- 12/18** *M. militaris* (Fabricius, 1775)
as *Acrosoma armatum*, Fig. 885, Westindien, Porlorico
- 12/19** *M. patruelis* (C. L. Koch, 1839)
as *Acrosoma patruelis*, Fig. 524, Brasilien
- 12/20** *M. picta* (C. L. Koch, 1836)
as *Acrosoma pictum*, Fig. 214, Brasilien
- 12/21** *M. plana* (C. L. Koch, 1836)
as *Acrosoma planum*, Fig. 228
- 12/22** *M. saccata* (C. L. Koch, 1836)
as *Acrosoma saccatum*, Fig. 212, Brasilien
- 12/23** *M. schreibersi* (Perty, 1833)
as *Acrosoma spinosum*, Fig. 210, Südamerika
- 12/24** *M. sexspinoso* (Hahn, 1822)
as *Acrosoma sexspinoso*, Fig. 107, Brasilien
- 12/25** *M. sexspinoso* (Hahn, 1822)
as *Acrosoma militare*, Fig. 258, Brasilien
- 12/26** *M. swainsoni* (Perty, 1833)
as *Acrosoma swainsoni*, Fig. 519, Brasilien
- 12/27** *M. triangularis* (C. L. Koch, 1836)
as *Acrosoma triangulare*, Fig. 226, Brasilien
- 12/28** *M. vigorsi* (Perty, 1833)
as *Acrosoma vigorsi*, Fig. 520, Brasilien
- 12/29** *Miranda latro*
family placed by genus, Fig. 953, Südamerika, Montevideo
- 12/30** *Neoscona adianta* (Walckenaer, 1802)
as *Miranda pictilis*, Fig. 369, Griechenland
- 12/31** *N. hirta* (C. L. Koch, 1844)
as *Epeira hirta*, Fig. 888, Das Cap der guten Hoffnung
- 12/32** *N. subfusca* (C. L. Koch, 1837)
as *Atea subfusca*, Fig. 939, Griechenland (bei Nauplia)
- 12/33** *Nephila pilipes* (Fabricius, 1793)
as *Nephila fuscipes*, Fig. 528
- 12/34** *Nuctenea silvicultrix* (C. L. Koch, 1835)
as *Epeira silvicultrix*, Fig. 932, Oberpfalz, niederliegende Föhrenwaldungen
- 12/35** *N. silvicultrix* (C. L. Koch, 1835)
as *Epeira silvicultrix*, Fig. 933, Oberpfalz, niederliegende Föhrenwaldungen
- 12/36** *N. umbratica* (Clerck, 1757)
as *Epeira umbratica*, Fig. 112, Deutschland, Schweden, Frankreich
- 12/37** *N. umbratica* (Clerck, 1757)
as *Epeira umbratica*, Fig. 930
- 13/1** *N. umbratica* (Clerck, 1757)
as *Epeira umbratica*, Fig. 931
- 13/2** *Paraplectana hemisphaerica* (C. L. Koch, 1844)
as *Gasteracantha hemisphaerica*, Fig. 874, Das westliche Afrika, Sierra Leona
- 13/3** *Parawixia bistrata* (Rengger, 1836)
as *Epeira bicolor*, Fig. 374, Brasilien
- 13/4** *P. kochi* (Taczanowski, 1873)
as *Epeira optuntiae*, Fig. 909, Wahrscheinlich Brasilien
- 13/5** *Parazygiella montana* (C. L. Koch, 1834)
as *Zilla montana*, Fig. 536, Mittel- und Voralpen
- 13/6** *P. montana* (C. L. Koch, 1834)
as *Zilla montana*, Fig. 537, Mittel- und Voralpen
- 13/7** *Polys illepidus* C. L. Koch, 1843
Fig. 821, Ostindien, Sincapore, Bintang
- 13/8** *Singa hamata* (Clerck, 1757)
Fig. 197, Ganz Europa
- 13/9** *S. hamata* (Clerck, 1757)
Fig. 198, Ganz Europa
- 13/10** *S. hamata* melanocephala C. L. Koch, 1836
as *Singa melanocephala*, Fig. 199, Gegend von Triest
- 13/11** *S. nitidula* C. L. Koch, 1844
as *Epeira tubulosa*, Fig. 6, Deutschland und Frankreich
- 13/12** *S. nitidula* C. L. Koch, 1844
Fig. 946, Wiesenthäler bei Erlangen
- 13/13** *S. nitidula* C. L. Koch, 1844
Fig. 947, Wiesenthäler bei Erlangen
- 13/14** *Thelacantha cuspidata* (C. L. Koch, 1837)
as *Gasteracantha cuspidata*, Fig. 264, Java
- 13/15** *Trichonephila clavipes* fasciculata (De Geer, 1778)
as *Nephila fasciculata*, Fig. 354, Brasilien
- 13/16** *T. clavipes* fasciculata (De Geer, 1778)
as *Nephila fasciculata*, Fig. 355, Brasilien
- 13/17** *T. clavipes* (Linnaeus, 1767)
as *Nephila plumipes*, Fig. 529, Louisiana
- 13/18** *T. clavipes* (Linnaeus, 1767)
as *Epeira clavipes*, Fig. 89, Südamerika
- 13/19** *Wagneriana transitoria* (C. L. Koch, 1839)
as *Acrosoma transitorium*, Fig. 518, Brasilien
- 13/20** *Zilla diodia* (Walckenaer, 1802)
as *Zilla albimacula*, Fig. 534, Deutschland
- 13/21** *Z. diodia* (Walckenaer, 1802)
as *Zilla albimacula*, Fig. 535, Deutschland
- 13/22** *Zygiella atrica* (C. L. Koch, 1845)
as *Eucharhia atrica*, Fig. 1030, Deutschland und Frankreich
- 13/23** *Z. atrica* (C. L. Koch, 1845)
as *Eucharhia atrica*, Fig. 1031, Deutschland und Frankreich
- 13/24** *Z. x-notata* (Clerck, 1757)
as *Zilla calophylla*, Fig. 538, Franken
- 13/25** *Z. x-notata* (Clerck, 1757)
as *Zilla calophylla*, Fig. 539, Franken

Linyphiidae

- 13/26** *Agyreta fuscipalpus* (C. L. Koch, 1836)
as *Micryphantes fuscipalpus*, Fig. 202, Bei Regensburg, Birkelgut
- 13/27** *A. rurestris* (C. L. Koch, 1836)
as *Micryphantes rurestris*, Fig. 231, Hiesige Gegend (Kartoffeläcker)
- 13/28** *A. rurestris* (C. L. Koch, 1836)
as *Micryphantes rurestris*, Fig. 232, Hiesige Gegend (Kartoffeläcker)
- 13/29** *Bathyphantes gracilis* (Blackwall, 1841)
as *Linyphia terricola*, Fig. 1047, Karlsbad in Böhmen; Oberpfalz in Baiern
- 13/30** *B. gracilis* (Blackwall, 1841)
as *Linyphia terricola*, Fig. 1048, Karlsbad in Böhmen; Oberpfalz in Baiern
- 13/31** *Bolyphantes alticeps* (Sundevall, 1833)
as *Bolyphantes stramineus*, Fig. 643, Bis jetzt nur in hiesiger Gegend
- 13/32** *B. luteolus* (Blackwall, 1833)
as *Bolyphantes alpestris*, Fig. 642, Die Alpen des südlichen Deutschlands
- 13/33** *Ceratinella brevis* (Wider, 1834)
as *Micryphantes phaeopus*, Fig. 1071, Baiern
- 13/34** *C. brevis* (Wider, 1834)
as *Micryphantes phaeopus*, Fig. 1072, Baiern
- 13/35** *Dicymbium nigrum* (Blackwall, 1834)
as *Erigone serotina*, Fig. 663, Deutschland, Gärten bei Regensburg
- 13/36** *D. nigrum* (Blackwall, 1834)
as *Erigone serotina*, Fig. 664, Deutschland, Gärten bei Regensburg
- 13/37** *Diplocephalus cristatus* (Blackwall, 1833)
as *Micryphantes caespitum*, Fig. 673
- 14/1** *D. cristatus* (Blackwall, 1833)
as *Micryphantes caespitum*, Fig. 674
- 14/2** *Dismodicus elevatus* (C.L.Koch, 1838)
as *Micryphantes elevatus*, Fig. 334, Die Donaugengen in Bayern
- 14/3** *D. elevatus* (C.L.Koch, 1838)
as *Micryphantes elevatus*, Fig. 335, Die Donaugengen in Bayern
- 14/4** *Drapetisca socialis* (Sundevall, 1833)
as *Meta tigrina*, Fig. 1051, Deutschland
- 14/5** *D. socialis* (Sundevall, 1833)
as *Meta tigrina*, Fig. 1052, Deutschland
- 14/6** *Erigone dentipalpis* (Wider, 1834)
Fig. 659, Hiesige Gegend; Odenwald
- 14/7** *E. dentipalpis* (Wider, 1834)
Fig. 660, Hiesige Gegend; Odenwald
- 14/8** *Floronia bucculenta* (Clerck, 1757)
as *Theridion pallidum*, Fig. 216, Bei Regensburg
- 14/9** *Gonatium rubellum* (Blackwall, 1841)
as *Micryphantes isabellinus*, Fig. 676, Deutschland; Kissingen, Unterfranken

- 14/10** *Gonatium rubellum* (Blackwall, 1841)
as Micryphantes isabellinus, Fig. 677, Deutschland; Kissingen, Unterfranken
- 14/11** *G. rubellum* (Blackwall, 1841)
as Micryphantes isabellinus, Fig. 678, Deutschland; Kissingen, Unterfranken
- 14/12** *Hylyphantes graminicola* (Sundevall, 1830)
as Micryphantes rubripes, Fig. 328, Deutschland
- 14/13** *H. graminicola* (Sundevall, 1830)
as Micryphantes rubripes, Fig. 329, Deutschland
- 14/14** *H. graminicola* (Sundevall, 1830)
as Theridion rubripes, Fig. 70, Hiesige Gegend
- 14/15** *Kaestneria dorsalis* (Wider, 1834)
as Micryphantes laminatus, Fig. 1070, Baiern
- 14/16** *Linyphia hortensis* Sundevall, 1830
as Linyphia frutetorum, Fig. 1044, Deutschland
- 14/17** *L. hortensis* Sundevall, 1830
as Linyphia frutetorum, Fig. 1045, Deutschland
- 14/18** *L. hortensis* Sundevall, 1830
as Linyphia frutetorum, Fig. 1046, Deutschland
- 14/19** *L. triangularis* (Clerck, 1757)
as Linyphia montana, Fig. 1038, Europa, Schweden, Deutschland, Frankreich
- 14/20** *L. triangularis* (Clerck, 1757)
as Linyphia montana, Fig. 1039, Europa, Schweden, Deutschland, Frankreich
- 14/21** *Macrargus rufus* (Wider, 1834)
as Micryphantes erythrocephalus, Fig. 234, Hiesige Gegend (Kartoffelfelder)
- 14/22** *M. rufus* (Wider, 1834)
as Micryphantes erythrocephalus, Fig. 667, Hiesige Gegend, Oberpfalz, Karlsbad in Böhmen
- 14/23** *M. rufus* (Wider, 1834)
as Micryphantes erythrocephalus, Fig. 668, Hiesige Gegend, Oberpfalz, Karlsbad in Böhmen
- 14/24** *M. rufus* (Wider, 1834)
as Micryphantes aequalis, Fig. 669, Bayern; hiesige Gegend, Pentling und Hohengebraching
- 14/25** *M. rufus* (Wider, 1834)
as Micryphantes aequalis, Fig. 670, Bayern; hiesige Gegend, Pentling und Hohengebraching
- 14/26** *Megalethyphantes nebulosus* (Sundevall, 1830)
as Linyphia furcula, Fig. 1040, Um Regensburg
- 14/27** *M. nebulosus* (Sundevall, 1830)
as Linyphia circumflexa, Fig. 1050, Baiern
- 14/28** *Microlinyphia pusilla* (Sundevall, 1830)
as Linyphia pratensis, Fig. 1043, Deutschland, Frankreich
- 14/29** *M. pusilla* (Sundevall, 1830)
as Theridion signatum, Fig. 125, Die Gegend um Nürnberg
- 14/30** *Micryphantes acuminatus*
family placed by genus, Fig. 332, Odenwald und hiesige Gegend
- 14/31** *M. acuminatus*
family placed by genus, Fig. 333, Odenwald und hiesige Gegend
- 14/32** *M. alutaci* (C. L. Koch, 1837)
Fig. 1073, In hiesiger Gegend
- 14/33** *M. bicolor* (Hahn, 1833)
as Theridion bicolor, Fig. 69, Hiesige Nürnberger Gegend
- 14/34** *M. bicuspidatus*
family placed by genus, Fig. 338, Die Donaugegenden
- 14/35** *M. bicuspidatus*
family placed by genus, Fig. 339, Die Donaugegenden
- 14/36** *M. crassipalpus*
family placed by genus, Fig. 330, In hiesiger Gegend
- 14/37** *M. crassipalpus*
family placed by genus, Fig. 331, In hiesiger Gegend
- 15/1** *M. ochropus*
family placed by genus, Fig. 336, Die Gegend von Regensburg
- 15/2** *M. ochropus*
family placed by genus, Fig. 337, Die Gegend von Regensburg
- 15/3** *M. ovatus* C. L. Koch, 1833
Fig. 665, Deutschland, hiesige Gegend; Odenwald
- 15/4** *M. ovatus* C. L. Koch, 1833
Fig. 666, Deutschland, hiesige Gegend; Odenwald
- 15/5** *M. punctulatus* C. L. Koch, 1836
Fig. 170, Um Regensburg
- 15/6** *M. rufipalpus* C. L. Koch, 1836
Fig. 218, Bei Regensburg
- 15/7** *M. rufipalpus* C. L. Koch, 1836
Fig. 219, Bei Regensburg
- 15/8** *M. tessellatus* C. L. Koch, 1836
as Micryphantes tessellatus, Fig. 233, Bayern, Forstamt Vohenstraus
- 15/9** *M. villosus* C. L. Koch, 1845
Fig. 1075, Bei Erlangen
- 15/10** *Nerienne clathrata* (Sundevall, 1830)
as Linyphia multiguttata, Fig. 1037, Deutschland, Frankreich
- 15/11** *N. montana* (Clerck, 1757)
as Linyphia resupina, Fig. 1035, In Europa fast allenthalben
- 15/12** *N. montana* (Clerck, 1757)
as Linyphia resupina, Fig. 1036, In Europa fast allenthalben
- 15/13** *N. radiata* (Walckenaer, 1841)
as Linyphia marginata, Fig. 1041, Deutschland, Frankreich

- 15/14** *Nerienne radiata* (Walckenaer, 1841)
as Linyphia marginata, Fig. 1042, Deutschland, Frankreich
- 15/15** *Pelecopsis elongata* (Wider, 1834)
as Micryphantes inaequalis, Fig. 671, Hiesige Gegend
- 15/16** *P. elongata* (Wider, 1834)
as Micryphantes inaequalis, Fig. 672, Hiesige Gegend
- 15/17** *P. parallela* (Wider, 1834)
as Micryphantes pantherinus, Fig. 221, Die Donaugegenden
- 15/18** *Pityohyphantes phrygianus* (C. L. Koch, 1836)
as Linyphia phrygiana, Fig. 229, Bei Regensburg
- 15/19** *P. phrygianus* (C. L. Koch, 1836)
as Linyphia phrygiana, Fig. 230, Bei Regensburg
- 15/20** *Stemonyphantes lineatus* (Linnaeus, 1758)
as Theridion reticulatum, Fig. 124, Hiesige Umgebungen
- 15/21** *S. lineatus* (Linnaeus, 1758)
as Bolyphantes trilineatus, Fig. 641, Deutschland, in hiesiger Gegend nicht selten
- 15/22** *Tiso vagans* (Blackwall, 1834)
as Erigone longimana, Fig. 661, Deutschland, Gegend von Regensburg
- 15/23** *T. vagans* (Blackwall, 1834)
as Erigone longimana, Fig. 662, Deutschland, Gegend von Regensburg
- 15/24** *Walckenaeria acuminata* Blackwall, 1833
as Micryphantes camelinus, Fig. 168, Um Regensburg
- 15/25** *W. acuminata* Blackwall, 1833
as Micryphantes camelinus, Fig. 169, Um Regensburg
- 15/26** *W. antica* (Wider, 1834)
as Micryphantes tibialis, Fig. 203, Bei Regensburg
- 15/27** *W. antica* (Wider, 1834)
as Micryphantes tibialis, Fig. 675, Hiesige Gegend; Odenwald
- 15/28** *W. cucullata* (C. L. Koch, 1836)
as Micryphantes cucullatus, Fig. 200, Bei Regensburg
- 15/29** *W. cucullata* (C. L. Koch, 1836)
as Micryphantes cucullatus, Fig. 201, Bei Regensburg

Zoropsidae

- 15/30** *Zoropsis spinimana* (Dufour, 1820)
as Zora ocreata, Fig. 1345, Algier

Pisauridae

- 15/31** *Pisaura mirabilis* (Clerck, 1757)
as Dolomedes mirabilis, Fig. 120, Europa
- 15/32** *P. mirabilis* (Clerck, 1757)
as Ocyale mirabilis, Fig. 1346, Deutschland, Frankreich
- 15/33** *P. mirabilis* (Clerck, 1757)
as Ocyale rufofasciata, Fig. 1347, Schweden, Deutschland
- 15/34** *P. mirabilis* (Clerck, 1757)
as Ocyale murina, Fig. 1348, Griechenland
- 15/35** *Pisaurina mira* (Walckenaer, 1837)
as Dolomedes binotatus, Fig. 1356, Nordamerika
- 15/36** *Thaumasia marginella* (C. L. Koch, 1847)
as Dolomedes marginellus, Fig. 1355, Südamerika

Dolomedidae

- 15/37** *Dolomedes aerugineus* C. L. Koch, 1847
Fig. 1357, Amerika
- 16/1** *D. fimbriatus* (Clerck, 1757)
Fig. 10, Hiesige Gegend
- 16/2** *D. fimbriatus* (Clerck, 1757)
as Dolomedes limbatu, Fig. 11, Italien
- 16/3** *D. fimbriatus* (Clerck, 1757)
as Dolomedes marginatus, Fig. 12, Deutschland, Frankreich, Schweden
- 16/4** *D. fimbriatus* (Clerck, 1757)
Fig. 1352, Deutschland
- 16/5** *D. plantarius* (Clerck, 1757)
as Dolomedes fimbriatus, Fig. 1353, Deutschland
- 16/6** *D. plantarius* (Clerck, 1757)
as Dolomedes riparius, Fig. 148, Nürnberger Gegend
- 16/7** *D. plantarius* (Clerck, 1757)
Fig. 149, Deutschland, Schweden
- 16/8** *D. triton* (Walckenaer, 1837)
as Dolomedes scapularis, Fig. 1354, Nordamerika, Pennsylvanien

Trechaleidae

- 16/9** *Trechalea longitarsis* (C. L. Koch, 1847)
as Triclaria longitarsis, Fig. 1462, Columbien

Ancylometidae

- 16/10** *Ancylometes concolor* (Perty, 1833)
as Ctenus concolor, Fig. 1458, Brasilien

Lycosidae

- 16/11** *Agalenocosa belvosa* (C. L. Koch, 1847)
as Lycosa helvosa, Fig. 1380, St. Cruz
- 16/12** *Aglaoctenus oblongus* (C. L. Koch, 1847)
as Dolomedes oblongus, Fig. 1350, Südamerika, Montevideo
- 16/13** *A. oblongus* (C. L. Koch, 1847)
as Dolomedes sacer, Fig. 1351, Südamerika, Montevideo
- 16/14** *Alopecosa aculeata* (Clerck, 1757)
as Lycosa taeniata, Fig. 1396, Deutschland und Frankreich
- 16/15** *A. aculeata* (Clerck, 1757)
as Lycosa taeniata, Fig. 1397, Deutschland und Frankreich
- 16/16** *A. aculeata* (Clerck, 1757)
as Lycosa meridiana, Fig. 16, Hiesige Umgegend

- 16/17** *Alopecosa albofasciata* (Brullé, 1832)
as Lycosa sagittata, Fig. 1395, Gegend von Nauplia
- 16/18** *A. cuneata* (Clerck, 1757)
as Lycosa clavipes, Fig. 1403, Frankreich, Deutschland, Schweden
- 16/19** *A. cuneata* (Clerck, 1757)
as Lycosa clavipes, Fig. 1404, Frankreich, Deutschland, Schweden
- 16/20** *A. cuneata* (Clerck, 1757)
as Lycosa vorax, Fig. 78, Deutschland, Frankreich, Schweden
- 16/21** *A. cursor* (Hahn, 1831)
as Lycosa sabulosa, Fig. 13, Hiesige sandige Gegend
- 16/22** *A. cursor* (Hahn, 1831)
as Lycosa cursor, Fig. 14, Hiesige Gegend
- 16/23** *A. fabrilis* (Clerck, 1757)
as Lycosa fabrilis, Fig. 1389, Schweden, Deutschland und Frankreich
- 16/24** *A. fabrilis* (Clerck, 1757)
as Lycosa fabrilis, Fig. 1390, Schweden, Deutschland und Frankreich
- 16/25** *A. fabrilis* (Clerck, 1757)
as Lycosa fabrilis, Fig. 1391, Schweden, Deutschland und Frankreich
- 16/26** *A. fabrilis* (Clerck, 1757)
as Lycosa fabrilis, Fig. 1392, Schweden, Deutschland und Frankreich
- 16/27** *A. fabrilis* (Clerck, 1757)
as Lycosa melanogaster, Fig. 76, Hiesige Nürnberger Gegend
- 16/28** *A. farinosa* (Herman, 1879)
as Lycosa inquilina, Fig. 1387, Deutschland und Schweden
- 16/29** *A. farinosa* (Herman, 1879)
as Lycosa inquilina, Fig. 1388, Deutschland und Schweden
- 16/30** *A. fuscipes* (C. L. Koch, 1847)
Fig. 1398, Gegend von Nauplia, Griechenland
- 16/31** *A. obsoleta* (C. L. Koch, 1847)
as Lycosa obsoleta, Fig. 1377, Asien, Buchara
- 16/32** *A. pulverulenta* (Clerck, 1757)
as Lycosa cuneata, Fig. 1399, Schweden, Deutschland und Frankreich
- 16/33** *A. pulverulenta* (Clerck, 1757)
as Lycosa cuneata, Fig. 1400, Schweden, Deutschland und Frankreich
- 16/34** *A. pulverulenta* (Clerck, 1757)
as Lycosa gasteinensis, Fig. 1401, Alpenthärer, Gasteiner Thal
- 16/35** *A. pulverulenta* (Clerck, 1757)
as Lycosa gasteinensis, Fig. 1402, Alpenthärer, Gasteiner Thal
- 16/36** *A. schmidtii* (Hahn, 1835)
as Lycosa schmidtii, Fig. 147, Umgebungen von Laibach
- 16/37** *A. striatipes* (C. L. Koch, 1837)
as Lycosa striatipes, Fig. 1438, Bisher nur in der Gegend von Regensburg
- 17/1** *A. striatipes* (C. L. Koch, 1837)
as Lycosa lugubris, Fig. 15, Hiesige Gegend
- 17/2** *A. trabalis* (Clerck, 1757)
as Lycosa vorax, Fig. 1393, Europa diesseits der Alpen
- 17/3** *A. trabalis* (Clerck, 1757)
as Lycosa vorax, Fig. 1394, Europa diesseits der Alpen
- 17/4** *Arctosa cinerea* (Fabricius, 1777)
Fig. 1358, An der Küste der Ostsee und des Baltischen Meeres
- 17/5** *A. cinerea* (Fabricius, 1777)
as Lycosa allodroma, Fig. 410, Deutschland und
- 17/6** *A. cinerea* (Fabricius, 1777)
as Lycosa allodroma, Fig. 411, Deutschland und
- 17/7** *A. intricaria* (C. L. Koch, 1847)
as Trochosa intricaria, Fig. 1367, Deutschland, vielleicht nur Norddeutschland
- 17/8** *A. leopardus* (Sundevall, 1833)
as Lycosa sericata, Fig. 1420, Baiern, bei Regensburg und in der Oberpfalz
- 17/9** *A. maculata* (Hahn, 1822)
as Arctosa farinosa, Fig. 1360, Deutschland
- 17/10** *A. maculata* (Hahn, 1822)
as Lycosa amylacea, Fig. 412, In hiesiger Gegend, an dem Ufer der Donau
- 17/11** *A. perita* (Latreille, 1799)
Fig. 1362, Deutschland, Bayern
- 17/12** *A. perita* (Latreille, 1799)
Fig. 1363, Deutschland, Bayern
- 17/13** *A. perita* (Latreille, 1799)
as Arctosa lynx, Fig. 1364, Deutschland, Bayern
- 17/14** *A. perita* (Latreille, 1799)
as Lycosa picta, Fig. 79, Hiesige Nürnberger Gegend
- 17/15** *A. variana* C. L. Koch, 1847
Fig. 1359, Aus der Gegend von Nauplia
- 17/16** *Aulonia albimana* (Walckenaer, 1805)
Fig. 1411, Deutschland
- 17/17** *A. albimana* (Walckenaer, 1805)
Fig. 1412, Deutschland
- 17/18** *Geolycosa vultuosa* (C. L. Koch, 1838)
as Lycosa vultuosa, Fig. 407, Ungewiss
- 17/19** *G. vultuosa* (C. L. Koch, 1838)
as Lycosa vultuosa, Fig. 408, Ungewiss
- 17/20** *Hogna graeca* (Roewer, 1951)
as Lycosa grisea, Fig. 1386, Gegend von Nauplia

17/21 *Hogna ornata* (Perty, 1833)
as *Lycosa ornata*, Fig. 1381, Brasilien

17/22 *H. radiata* (Latreille, 1817)
as *Lycosa isabellina*, Fig. 1384, Südfrankreich, Montpellier

17/23 *H. radiata* (Latreille, 1817)
as *Lycosa hellenica*, Fig. 181, Griechenland (Nauplia)

17/24 *H. radiata* (Latreille, 1817)
as *Lycosa hellenica*, Fig. 409

17/25 *H. radiata* (Latreille, 1817)
as *Lycosa xylina*, Fig. 415, Gegend von Algier

17/26 *H. radiata* (Latreille, 1817)
as *Lycosa famelica*, Fig. 417, Halbinsel Morea

17/27 *H. vulpina* (C. L. Koch, 1847)
as *Lycosa vulpina*, Fig. 1383, Brasilien

17/28 *Lycosa cingara* (C. L. Koch, 1847)
as *Arctosa cingara*, Fig. 1361, Aegypten

17/29 *L. erythronatha* Lucas, 1836
as *Lycosa erythrostoma*, Fig. 1378, Brasilien, St. Paul

17/30 *L. erythronatha* Lucas, 1836
as *Lycosa ruhimana*, Fig. 1385, Südamerika, Montevideo

17/31 *L. Lynx*
family placed by genus, Fig. 104, Hiesige Nürnberger Gegend

17/32 *L. paludosa*
family placed by genus, Fig. 105, In hiesiger Umgebung

17/33 *L. poliostoma* (C. L. Koch, 1847)
as *Tarentula poliostoma*, Fig. 1379, Südamerika, Montevideo

17/34 *L. praegrans* C. L. Koch, 1836
Fig. 180, Griechenland

17/35 *L. praegrans* C. L. Koch, 1836
Fig. 414, Griechenland

17/36 *L. singoriensis* (Laxmann, 1770)
as *Lycosa latreillei*, Fig. 406, Das südliche Russland

17/37 *L. singoriensis* (Laxmann, 1770)
as *Lycosa latreillei*, Fig. 74, Südliches Russland

18/1 *L. singoriensis* (Laxmann, 1770)
as *Lycosa latreillei*, Fig. 74, Südliches Russland

18/2 *L. tarantula* (Linnaeus, 1758)
as *Lycosa narbonensis*, Fig. 1375, Südfrankreich

18/3 *L. tarantula* (Linnaeus, 1758)
Fig. 413, Gegend von Bologna

18/4 *L. tarantula* (Linnaeus, 1758)
as *Lycosa rubiginosa*, Fig. 416, Oberitalien

18/5 *L. tarantula* (Linnaeus, 1758)
Fig. 73, Südliche Teile von Italien, Spanien und Portugal

18/6 *L. tarantula* (Linnaeus, 1758)
Fig. 73, Südliche Teile von Italien, Spanien und Portugal

18/7 *L. tarantuloides* Perty, 1833
as *Lycosa (Tarantula) pertyi*, Fig. 1382, Brasilien

18/8 *Ocyale rufa*
family placed by genus, Fig. 1349, Nordamerika, Pennsylvanien, Georgien

18/9 *Pardosa agricola* (Thorell, 1856)
as *Lycosa arenaria*, Fig. 1441, Ufer der Donau

18/10 *P. agricola* (Thorell, 1856)
as *Lycosa arenaria*, Fig. 1442, Ufer der Donau

18/11 *P. alacris* (C. L. Koch, 1833)
as *Lycosa alacris*, Fig. 1443, Deutschland, auch in Frankreich und Schweden

18/12 *P. alacris* (C. L. Koch, 1833)
as *Lycosa alacris*, Fig. 1444, Deutschland, auch in Frankreich und Schweden

18/13 *P. alacris* (C. L. Koch, 1833)
as *Lycosa silvicultrix*, Fig. 182, Südliches Deutschland diesseits der Alpen

18/14 *P. alacris* (C. L. Koch, 1833)
as *Lycosa silvicultrix*, Fig. 183, Südliches Deutschland diesseits der Alpen

18/15 *P. amentata* (Clerck, 1757)
as *Lycosa paludicola*, Fig. 1421, Schweden, Deutschland und Frankreich

18/16 *P. amentata* (Clerck, 1757)
as *Lycosa paludicola*, Fig. 1422, Schweden, Deutschland und Frankreich

18/17 *P. amentata* (Clerck, 1757)
as *Lycosa saccata*, Fig. 81, Allenthalben in Europa

18/18 *P. atomaria* (C. L. Koch, 1847)
as *Lycosa atomaria*, Fig. 1437, Gegend von Nauplia in Griechenland

18/19 *P. bifasciata* (C. L. Koch, 1834)
as *Lycosa bifasciata*, Fig. 1439, Deutschland

18/20 *P. bifasciata* (C. L. Koch, 1834)
as *Lycosa bifasciata*, Fig. 1440, Deutschland

18/21 *P. blanda* (C. L. Koch, 1833)
as *Lycosa blanda*, Fig. 1428, Gebirgen von Salzburg, bayerische Gebirge an der böhmischen Grenze

18/22 *P. blanda* (C. L. Koch, 1833)
as *Lycosa blanda*, Fig. 1429, Gebirgen von Salzburg, bayerische Gebirge an der böhmischen Grenze

18/23 *P. blanda* (C. L. Koch, 1833)
as *Lycosa blanda*, Fig. 1430, Gebirgen von Salzburg, bayerische Gebirge an der böhmischen Grenze

18/24 *P. hortensis* (Thorell, 1872)
as *Lycosa saccata*, Fig. 1451, Deutschland, auch Schweden und Nordfrankreich

18/25 *Pardosa hortensis* (Thorell, 1872)
as *Lycosa saccata*, Fig. 1452, Deutschland, auch Schweden und Nordfrankreich

18/26 *P. invenusta* (C. L. Koch, 1837)
as *Lycosa invenusta*, Fig. 1434, Halbinsel Morea, aus der Gegend von Nauplia

18/27 *P. monticola* (Clerck, 1757)
as *Lycosa (Pardosa) monticola*, Fig. 1445

18/28 *P. monticola* (Clerck, 1757)
as *Lycosa monticola*, Fig. 1446

18/29 *P. monticola* (Clerck, 1757)
as *Lycosa monticola*, Fig. 1448

18/30 *P. nigra* (C. L. Koch, 1834)
as *Lycosa nigra*, Fig. 1423, Alpen höherer Lage, Nassfelder Alpen im Salzburgerischen

18/31 *P. nigra* (C. L. Koch, 1834)
as *Lycosa nigra*, Fig. 1424, Alpen höherer Lage, Nassfelder Alpen im Salzburgerischen

18/32 *P. paludicola* (Clerck, 1757)
as *Lycosa fumigata*, Fig. 1425, Deutschland und Schweden

18/33 *P. paludicola* (Clerck, 1757)
as *Lycosa fumigata*, Fig. 1426, Deutschland und Schweden

18/34 *P. palustris* (Linnaeus, 1758)
as *Lycosa monticola*, Fig. 1447

18/35 *P. palustris* (Linnaeus, 1758)
as *Lycosa monticola*, Fig. 1449

18/36 *P. proxima* (C. L. Koch, 1847)
as *Lycosa proxima*, Fig. 1453, Griechenland

18/37 *P. proxima* (C. L. Koch, 1847)
as *Lycosa proxima*, Fig. 1454, Griechenland

19/1 *P. pullata* (Clerck, 1757)
as *Lycosa pullata*, Fig. 1431, Europa

19/2 *P. pullata* (Clerck, 1757)
as *Lycosa pullata*, Fig. 1432, Europa

19/3 *P. pullata* (Clerck, 1757)
as *Lycosa pullata*, Fig. 1433, Europa

19/4 *P. riparia* (C. L. Koch, 1833)
as *Lycosa riparia*, Fig. 1435, Bayern, an den Ufern der Donau

19/5 *P. riparia* (C. L. Koch, 1833)
as *Lycosa riparia*, Fig. 1436, Bayern, an den Ufern der Donau

19/6 *P. riparia* (C. L. Koch, 1833)
as *Lycosa cursoria*, Fig. 1450, Bauern im Oberland, auch bei Karlsbad in Böhmen

19/7 *P. wagleri* (Hahn, 1822)
as *Lycosa wagleri*, Fig. 1427, Die höhern Gegenden von Oberbayern

19/8 *Pirata piraticus* (Clerck, 1757)
as *Lycosa piratica*, Fig. 1413, Schweden, Deutschland und Frankreich

19/9 *P. piraticus* (Clerck, 1757)
as *Lycosa piratica*, Fig. 1414, Schweden, Deutschland und Frankreich

19/10 *P. piraticus* (Clerck, 1757)
as *Lycosa piratica*, Fig. 80, Deutschland, Frankreich und Schweden

19/11 *P. piscatorius* (Clerck, 1757)
as *Trochosa umbraticola*, Fig. 1368, Bei Erlangen

19/12 *Piratula knorri* (Scopoli, 1763)
as *Lycosa piscatoria*, Fig. 1417, Karlsbad in Böhmen, Oberbayern

19/13 *P. knorri* (Scopoli, 1763)
as *Lycosa piscatoria*, Fig. 1418, Karlsbad in Böhmen, Oberbayern

19/14 *P. knorri* (Scopoli, 1763)
as *Lycosa piscatoria*, Fig. 1419, Karlsbad in Böhmen, Oberbayern

19/15 *P. latitans* (Blackwall, 1841)
as *Lycosa palustris*, Fig. 1415, Deutschland

19/16 *P. latitans* (Blackwall, 1841)
as *Lycosa palustris*, Fig. 1416, Deutschland

19/17 *Tigrosa helluo* (Walckenaer, 1837)
as *Tarentula vafra*, Fig. 1365, Amerika

19/18 *T. helluo* (Walckenaer, 1837)
as *Tarentula vafra*, Fig. 1366, Amerika

19/19 *Trochosa robusta* (Simon, 1876)
as *Trochosa ruricola*, Fig. 1369

19/20 *T. robusta* (Simon, 1876)
as *Trochosa ruricola*, Fig. 1370

19/21 *T. robusta* (Simon, 1876)
as *Trochosa trabalis*, Fig. 1374

19/22 *T. ruricola* (De Geer, 1778)
as *Trochosa trabalis*, Fig. 1371

19/23 *T. ruricola* (De Geer, 1778)
as *Trochosa trabalis*, Fig. 1372

19/24 *T. ruricola* (De Geer, 1778)
as *Lycosa alpina*, Fig. 146, Alpen bei Tegernsee und Benedikt-Bayern

19/25 *T. ruricola* (De Geer, 1778)
as *Lycosa ruricola*, Fig. 77, Deutschland, Frankreich und Schweden

19/26 *T. terricola* Thorell, 1856
as *Trochosa trabalis*, Fig. 1373

19/27 *Venatrix funesta* (C. L. Koch, 1847)
as *Lycosa funesta*, Fig. 1376, Neuholland, Vandiemsland

19/28 *Xerolycosa miniata* (C. L. Koch, 1834)
as *Lycosa miniata*, Fig. 1406, Bayern, um Regensburg

19/29 *Xerolycosa miniata* (C. L. Koch, 1834)
as *Lycosa miniata*, Fig. 1407, Bayern, um Regensburg

19/30 *X. miniata* (C. L. Koch, 1834)
as *Lycosa miniata*, Fig. 1408, Bayern, um Regensburg

19/31 *X. nemoralis* (Westring, 1861)
as *Lycosa alpica*, Fig. 1405, Süddeutschland

19/32 *X. nemoralis* (Westring, 1861)
as *Lycosa nivalis*, Fig. 1409, Deutschland und Schweden

19/33 *X. nemoralis* (Westring, 1861)
as *Lycosa nivalis*, Fig. 1410, Deutschland und Schweden

Oxyopidae

19/34 *Oxyopes heterophthalmus* (Latreille, 1804)
as *Sphasus lineatus*, Fig. 171, Das südliche Frankreich, Griechenland

19/35 *O. heterophthalmus* (Latreille, 1804)
as *Sphasus lineatus*, Fig. 172, Das südliche Frankreich, Griechenland

19/36 *O. lineatipes* (C. L. Koch, 1847)
as *Sphasus lineatipes*, Fig. 1455, Ostindien, Singapore

19/37 *O. lineatus* Latreille, 1806
as *Sphasus gentilis*, Fig. 404, Die Halbinsel Morea

20/1 *O. pallidus* (C. L. Koch, 1838)
as *Sphasus pallidus*, Fig. 405, Westindien

20/2 *O. ramosus* (Martini & Goeze, 1778)
as *Oxyopes variegatus*, Fig. 121, Südliches Frankreich, hiesige Gegend

20/3 *O. ramosus* (Martini & Goeze, 1778)
as *Sphasus variegatus*, Fig. 403, Frankreich und Deutschland

20/4 *Peucetia thalassina* (C. L. Koch, 1847)
as *Sphasus thalassinus*, Fig. 1456, Westindien, St. Domingo

Ctenidae

20/5 *Isoctenus janeirus* (Walckenaer, 1837)
as *Ctenus cinnamomeus*, Fig. 1457

20/6 *Phoneutria fera* Perty, 1833
Fig. 1459, Brasilien

20/7 *P. ochracea* C. L. Koch, 1847
Fig. 1460, Brasilien

20/8 *P. rufibarbis* Perty, 1833
Fig. 1461, Brasilien

Gnaphosidae

20/9 *Aphantaulax trifasciata* (O. Pickard-Cambridge, 1872)
as *Melanophora bimaculata*, Fig. 488, Griechenland

20/10 *Callilepis nocturna* (Linnaeus, 1758)
as *Pythionissa maculata*, Fig. 474, Deutschland

20/11 *C. nocturna* (Linnaeus, 1758)
as *Pythionissa maculata*, Fig. 475, Deutschland

20/12 *Drassodes lapidosus* (Walckenaer, 1802)
as *Clubiona lapidicola*, Fig. 100, Deutschland und Frankreich

20/13 *D. lapidosus* (Walckenaer, 1802)
as *Drassus lapidicola*, Fig. 450, Deutschland und Frankreich

20/14 *D. lapidosus* (Walckenaer, 1802)
as *Drassus lapidicola*, Fig. 451, Deutschland und Frankreich

20/15 *D. lapidosus* (Walckenaer, 1802)
as *Drassus cinereus*, Fig. 840

20/16 *D. lapidosus* (Walckenaer, 1802)
as *Drassus cinereus*, Fig. 95, Hiesige Gegend

20/17 *D. lutescens* (C. L. Koch, 1839)
as *Drassus lutescens*, Fig. 445, Griechenland, Gegend von Nauplia

20/18 *D. lutescens* (C. L. Koch, 1839)
as *Drassus lutescens*, Fig. 839

20/19 *D. montanus* (Hahn, 1834)
as *Drassus montanus*, Fig. 103, Muggendorf im Bayreuthischen

20/20 *D. murinus* (Hahn, 1834)
as *Drassus murinus*, Fig. 141, Um Nürnberg

20/21 *D. murinus* (Hahn, 1834)
as *Drassus murinus*, Fig. 836, Bei Erlangen

20/22 *D. rufus* (C. L. Koch, 1839)
as *Drassus rufus*, Fig. 453, Deutschland, hiesige Gegend

20/23 *D. rufus* (C. L. Koch, 1839)
as *Drassus rufus*, Fig. 454, Deutschland, hiesige Gegend

20/24 *D. severus* (C. L. Koch, 1839)
as *Drassus severus*, Fig. 446, Griechenland

20/25 *Drassus melanogaster*
family placed by genus, Fig. 102, Frankreich und Deutschland

20/26 *D. nigrinus*
Fig. 93, Deutschland und die Schweiz

20/27 *Drassyllus pumilus* (C. L. Koch, 1839)
as *Melanophora pumila*, Fig. 480, In den Donaugegenden, in hiesiger Gegend

20/28 *D. pumilus* (C. L. Koch, 1839)
as *Melanophora pumila*, Fig. 481, In den Donaugegenden, in hiesiger Gegend

20/29 *D. pusillus* (C. L. Koch, 1833)
as *Melanophora pusilla*, Fig. 496, Deutschland

20/30 *D. pusillus* (C. L. Koch, 1833)
as *Melanophora pusilla*, Fig. 835

20/31 *Gnaphosa bicolor* (Hahn, 1833)
as *Pythionissa tricolor*, Fig. 479, Deutschland

20/32 *G. bicolor* (Hahn, 1833)
as *Pythionissa fuliginea*, Fig. 834, In hiesiger Gegend, auch in der Oberpfalz

20/33 *Gnaphosa bicolor* (Hahn, 1833)
as Drassus bicolor, Fig. 94, Hiesige Umgebung

20/34 *G. fumosa* (C. L. Koch, 1843)
as Pythonissa fumosa, Fig. 832, Bayern

20/35 *G. lucifuga* (Walckenaer, 1802)
as Pythonissa lucifuga, Fig. 468, Deutschland und Frankreich

20/36 *G. lucifuga* (Walckenaer, 1802)
as Pythonissa lucifuga, Fig. 469, Deutschland und Frankreich

20/37 *G. lucifuga* (Walckenaer, 1802)
as Pythonissa lucifuga, Fig. 470, Deutschland und Frankreich

21/1 *G. lucifuga* (Walckenaer, 1802)
as Pythonissa fusca, Fig. 471, Deutschland

21/2 *G. lucifuga* (Walckenaer, 1802)
as Pythonissa occulta, Fig. 472, Deutschland

21/3 *G. lugubris* (C. L. Koch, 1839)
as Pythonissa lugubris, Fig. 473, Die Gegend von Nauplia auf Morea

21/4 *G. nana* (C. L. Koch, 1843)
as Pythonissa nana, Fig. 833, Bayern, bisher nur um Erlangen

21/5 *Haplodrassus cognatus* (Westring, 1861)
as Drassus fuscus, Fig. 837, Frankreich und Deutschland

21/6 *H. rufipes* (Lucas, 1846)
as Drassus severus, Fig. 838

21/7 *H. signifer* (C. L. Koch, 1839)
as Drassus signifer, Fig. 452, Bei Carlsbad in Böhmen

21/8 *H. signifer* (C. L. Koch, 1839)
as Drassus troglodytes, Fig. 455, Donaugegenden, bei Regensburg

21/9 *H. signifer* (C. L. Koch, 1839)
as Drassus troglodytes, Fig. 456, Donaugegenden, bei Regensburg

21/10 *Micaria formicaria* (Sundevall, 1831)
as Macaria aurulenta, Fig. 499, Die Gegenden der Donau

21/11 *M. fulgens* (Walckenaer, 1802)
as Drassus relucens, Fig. 143, Deutschland und Frankreich

21/12 *M. fulgens* (Walckenaer, 1802)
as Macaria fastuosa, Fig. 498, In hiesiger Gegend

21/13 *M. guttulata* (C. L. Koch, 1839)
as Macaria guttulata, Fig. 500, In den Donaugegenden

21/14 *M. pulicaria* (Sundevall, 1831)
as Macaria nitens, Fig. 497, Zweibrücken in Rheinbayern

21/15 *M. pulicaria* (Sundevall, 1831)
as Macaria formosa, Fig. 501, Zweibrücken

21/16 *Nomisia exornata* (C. L. Koch, 1839)
as Pythonissa exornata, Fig. 476, Die Gegend von Nauplia in Griechenland

21/17 *N. exornata* (C. L. Koch, 1839)
as Pythonissa exornata, Fig. 477, Die Gegend von Nauplia in Griechenland

21/18 *Poecilochroa variana* (C. L. Koch, 1839)
as Pythonissa variana, Fig. 478, Bodenlaube bei Kissingen in Franken

21/19 *Pterotricha lentiginosa* (C. L. Koch, 1837)
as Drassus lentiginosa, Fig. 459, Griechenland

21/20 *Scotophaeus quadripunctatus* (Linnaeus, 1758)
as Drassus sericeus, Fig. 457, Deutschland und Schweden

21/21 *S. quadripunctatus* (Linnaeus, 1758)
as Drassus sericeus, Fig. 458, Deutschland und Schweden

21/22 *Trachyzelotes pedestris* (C. L. Koch, 1837)
as Melanophora pedestris, Fig. 489, Deutschland

21/23 *Zelotes argoliensis* (C. L. Koch, 1839)
as Melanophora argoliensis, Fig. 483, Griechenland

21/24 *Z. electus* (C. L. Koch, 1839)
as Melanophora electa, Fig. 490, Die Donaugegenden bei Regensburg

21/25 *Z. flavimanus* (C. L. Koch, 1839)
as Melanophora flavimana, Fig. 484, Griechenland

21/26 *Z. latreillei* (Simon, 1878)
as Drassus ater, Fig. 142, Deutschland und Frankreich

21/27 *Z. latreillei* (Simon, 1878)
as Melanophora atra, Fig. 493, Deutschland

21/28 *Z. oblongus* (C. L. Koch, 1833)
as Melanophora oblonga, Fig. 487, Nassfelder Alpen im Salzburgerischen

21/29 *Z. petrensis* (C. L. Koch, 1839)
as Melanophora petrensis, Fig. 494, In hiesiger Gegend

21/30 *Z. petrensis* (C. L. Koch, 1839)
as Melanophora petrensis, Fig. 495, In hiesiger Gegend

21/31 *Z. subterraneus* (C. L. Koch, 1833)
as Melanophora violacea, Fig. 482, Deutschland

21/32 *Z. subterraneus* (C. L. Koch, 1833)
as Melanophora subterranea, Fig. 491, Deutschland

21/33 *Z. subterraneus* (C. L. Koch, 1833)
as Melanophora subterranea, Fig. 492, Deutschland

Trachycosmidae

21/34 *Morebilus plagusius* (Walckenaer, 1837)
as Delena plagusia, Fig. 987, Neuholland

Phrurolithidae

21/35 *Phrurolithus festivus* (C. L. Koch, 1835)
Fig. 511, Deutschland

21/36 *P. festivus* (C. L. Koch, 1835)
Fig. 512, Deutschland

21/37 *P. minimus* C. L. Koch, 1839
Fig. 513, Deutschland

22/1 *Phrurolithus rufescens* C. L. Koch, 1839
Fig. 514, Um Nürnberg

Liocranidae

22/2 *Agroeca brunnea* (Blackwall, 1833)
as Philoica linotina, Fig. 826, Bayern

22/3 *Liocranum rupicola* (Walckenaer, 1830)
as Philoica notata, Fig. 631, Ueberall in Deutschland, auch tiefer im Norden von Europa

22/4 *L. rupicola* (Walckenaer, 1830)
as Philoica notata, Fig. 632, Ueberall in Deutschland, auch tiefer im Norden von Europa

Clubionidae

22/5 *Clubiona caerulea* L. Koch, 1867
as Clubiona holosericea, Fig. 84, Ganz Europa

22/6 *C. comta* C. L. Koch, 1839
Fig. 440, Kissingen in Franken, Oberpfalz, bayerische Voralpen

22/7 *C. comta* C. L. Koch, 1839
Fig. 841

22/8 *C. pallens* Hahn, 1833
Fig. 101, Hiesige Nürnberger Umgebung

22/9 *C. pallens* Hahn, 1833
Fig. 443, Deutschland

22/10 *C. pallens* Hahn, 1833
Fig. 444, Deutschland

22/11 *C. pallidula* (Clerck, 1757)
as Clubiona incomta, Fig. 442, In hiesiger Gegend

22/12 *C. pallidula* (Clerck, 1757)
as Clubiona amarantha, Fig. 85, Deutschland und Frankreich

22/13 *C. phragmitis* C. L. Koch, 1843
Fig. 846, In hiesiger Gegend, häufiger bei Erlangen

22/14 *C. phragmitis* C. L. Koch, 1843
Fig. 847, In hiesiger Gegend, häufiger bei Erlangen

22/15 *C. phragmitis* C. L. Koch, 1843
as Clubiona pellucida, Fig. 848, Bayern

22/16 *C. punctata*
family placed by genus, Fig. 99, Umgebung hiesiger Stadt

22/17 *C. putris* C. L. Koch, 1839
Fig. 441, Erlangen

22/18 *C. rubicunda* C. L. Koch, 1843
Fig. 849, Die Provinz Oberpfalz in Bayern

22/19 *C. subsultans* Thorell, 1875
as Clubiona erratica, Fig. 842, Deutschland

22/20 *C. subsultans* Thorell, 1875
as Clubiona erratica, Fig. 843, Deutschland

22/21 *C. trivialis* C. L. Koch, 1843
Fig. 844, Süddeutschland

22/22 *C. trivialis* C. L. Koch, 1843
Fig. 845, Süddeutschland

Cheiracanthiidae

22/23 *Cheiracanthium erraticum* (Walckenaer, 1802)
as Cheiracanthium carnifex, Fig. 438, Deutschland, disseits und jenseits der Alpen

22/24 *C. erraticum* (Walckenaer, 1802)
as Cheiracanthium carnifex, Fig. 439, Deutschland, disseits und jenseits der Alpen

22/25 *C. pelagicum* (C. L. Koch, 1837)
Fig. 436, Griechenland

22/26 *C. pelagicum* (C. L. Koch, 1837)
Fig. 437, Griechenland

22/27 *C. punctorium* (Villers, 1789)
as Cheiracanthium nutrix, Fig. 434, Deutschland und Frankreich

22/28 *C. punctorium* (Villers, 1789)
as Cheiracanthium nutrix, Fig. 435, Deutschland und Frankreich

22/29 *C. punctorium* (Villers, 1789)
as Clubiona nutrix, Fig. 98, Deutschland und Frankreich

Miturgidae

22/30 *Zora spinimana* (Sundevall, 1833)
Fig. 1343, Schweden, Deutschland und Frankreich

22/31 *Z. spinimana* (Sundevall, 1833)
Fig. 1344, Schweden, Deutschland und Frankreich

Corinnidae

22/32 *Castianeira amoena* (C. L. Koch, 1841)
as Corinna amoena, Fig. 705, Carolina

22/33 *C. cingulata* (C. L. Koch, 1841)
as Corinna cingulata, Fig. 706, Pennsylvania

22/34 *C. tricolor* (C. L. Koch, 1841)
as Corinna tricolor, Fig. 707, Pennsylvania

22/35 *Corinna rubripes* C. L. Koch, 1841
Fig. 702, Brasilien, Bahia

22/36 *Creugas nigricans* (C. L. Koch, 1841)
as Corinna nigricans, Fig. 703, Mexico

22/37 *Mazax memnonia* (C. L. Koch, 1841)
as Corinna memnonia, Fig. 704, Columbien

23/1 *Myrmecium rufum* Latreille, 1824
as Myrmecia xanthopus, Fig. 699, Brasilien

23/2 *M. rufum* Latreille, 1824
as Myrmecia vertebrata, Fig. 700, Brasilien

23/3 *Sphecotypus niger* (Perty, 1833)
as Myrmecia nigra, Fig. 701, Brasilien, aus der Gegend von Sebastianopol

Anypaenidae

23/4 *Aysa brevimana* (C. L. Koch, 1839)
as Drassus brevimanus, Fig. 447, Bahia in Brasilien

Selenopidae

23/5 *Selenops spixi* Perty, 1833
Fig. 986

Sparassidae

23/6 *Curicaberis ferrugineus* (C. L. Koch, 1836)
as Ocypte ferruginea, Fig. 196

23/7 *Delena cancerides* Walckenaer, 1837
as Delena impressa, Fig. 988, Neuholland

23/8 *D. cancerides* Walckenaer, 1837
as Delena impressa, Fig. 989, Neuholland

23/9 *Eusparassus walckenaeri* (Audouin, 1826)
as Ocypte tersa, Fig. 305, Griechenland

23/10 *E. walckenaeri* (Audouin, 1826)
as Ocypte tersa, Fig. 980, Auf der Halbinsel Morea

23/11 *E. walckenaeri* (Audouin, 1826)
as Ocypte tersa, Fig. 981, Auf der Halbinsel Morea

23/12 *Heteropoda gracilipes* (C. L. Koch, 1845)
as Ocypte gracilipes, Fig. 977, Unbekannt

23/13 *H. testacea* (C. L. Koch, 1837)
as Ocypte testacea, Fig. 303, Nordamerika

23/14 *H. venatoria* (Linnaeus, 1767)
as Ocypte setulosa, Fig. 195, Brasilien

23/15 *H. venatoria* (Linnaeus, 1767)
as Ocypte pallens, Fig. 304, Westindien

23/16 *H. venatoria* (Linnaeus, 1767)
as Ocypte murina, Fig. 978, Ostindien, Pulotaz

23/17 *H. venatoria* (Linnaeus, 1767)
as Ocypte thoracica, Fig. 982, Java

23/18 *H. venatoria* (Linnaeus, 1767)
as Ocypte draco, Fig. 983, St. Thomas

23/19 *Micrommata ligurina* (C. L. Koch, 1845)
as Sparassus ligurinus, Fig. 1020, Griechenland

23/20 *M. virescens* (Clerck, 1757)
as Sparassus virescens, Fig. 1019

23/21 *M. virescens* (Clerck, 1757)
as Sparassus ornatus, Fig. 1021, Frankreich, Deutschland, Schweden

23/22 *M. virescens* (Clerck, 1757)
as Micrommata smaragdina, Fig. 89, Beinahe in allen Ländern Europas

23/23 *Olios argelasius* (Walckenaer, 1806)
as Ocypte vulpina, Fig. 974, Neapel

23/24 *O. detritus* (C. L. Koch, 1845)
as Ocypte detrita, Fig. 976, Afrika

23/25 *Palystes castaneus* (Latreille, 1819)
as Ocypte melanogaster, Fig. 975, Das Vorgebirg der guten Hoffnung

23/26 *P. castaneus* (Latreille, 1819)
as Ocypte nobilis, Fig. 979, Das Cap der guten Hoffnung

23/27 *P. deraus* (C. L. Koch, 1845)
as Ocypte dera, Fig. 973, Das Vorgebirg der guten Hoffnung

23/28 *Parapalystes megacephalus* (C. L. Koch, 1845)
as Ocypte megacephala, Fig. 972, Das Vorgebirg der guten Hoffnung

Philodromidae

23/29 *Emargidromus emarginatus* (Schrank, 1803)
as Artamus griseus, Fig. 1013, Deutschland

23/30 *E. emarginatus* (Schrank, 1803)
as Artamus griseus, Fig. 1014, Deutschland

23/31 *E. emarginatus* (Schrank, 1803)
as Thomisus griseus, Fig. 91, Hiesige Nürnberger Gegend

23/32 *Philodromus aureolus* (Clerck, 1757)
as Thomisus aureolus, Fig. 144, Deutschland, Frankreich, Schweden

23/33 *P. aureolus* (Clerck, 1757)
as Thomisus aureolus, Fig. 145, Deutschland, Frankreich, Schweden

23/34 *P. corticinus* (C. L. Koch, 1837)
as Artamus corticinus, Fig. 306, In hiesiger Gegend

23/35 *P. dispar* Walckenaer, 1826
as Philodromus limbatus, Fig. 1017, Schweden und Deutschland

23/36 *P. dispar* Walckenaer, 1826
as Philodromus limbatus, Fig. 1018, Schweden und Deutschland

23/37 *P. margaritatus* (Clerck, 1757)
as Artamus jejunos, Fig. 1015, Deutschland

24/1 *P. margaritatus* (Clerck, 1757)
as Artamus jejunos, Fig. 1016, Deutschland

24/2 *P. margaritatus* (Clerck, 1757)
as Thomisus laevipes, Fig. 90, Hiesige Nürnberger Gegend

24/3 *Thanatus formicinus* (Clerck, 1757)
as Thomisus rhomboicus, Fig. 83, Deutschland, Frankreich und Schweden

24/4 *T. striatus* C. L. Koch, 1845
Fig. 1022, Bajern, die Gegend von Regensburg

24/5 *Tibellus oblongus* (Walckenaer, 1802)
as Thanatus parallelus, Fig. 307, Die Halbinsel Morea

24/6 *Tibellus oblongus* (Walckenaer, 1802)
as *Thomisus oblongus*, Fig. 82, Deutschland, Frankreich und Dänemark

Thomisidae

24/7 *Bassaniodes graecus* (C. L. Koch, 1837)
as *Xysticus graecus*, Fig. 291, Die Gegend von Nauplia in Griechenland

24/8 *B. robustus* (Hahn, 1832)
as *Xysticus lanio*, Fig. 1012, Bayern, auch in Böhmen bei Carlsbad

24/9 *B. robustus* (Hahn, 1832)
as *Xysticus morio*, Fig. 289, Gegend von Triest

24/10 *B. robustus* (Hahn, 1832)
as *Thomisus robustus*, Fig. 38, Abruzzan

24/11 *Coriarachne depressa* (C. L. Koch, 1837)
as *Xysticus depressus*, Fig. 292, In hiesiger Gegend

24/12 *Diaea dorsata* (Fabricius, 1777)
as *Thomisus dorsatus*, Fig. 34, Deutschland, Schweden und Frankreich

24/13 *D. dorsata* (Fabricius, 1777)
as *Thomisus dorsatus*, Fig. 991

24/14 *D. dorsata* (Fabricius, 1777)
as *Thomisus dorsatus*, Fig. 992

24/15 *D. dorsata* (Fabricius, 1777)
as *Thomisus capparinus*, Fig. 993, Ungarn, aus dem Banat

24/16 *D. dorsata* (Fabricius, 1777)
as *Thomisus capparinus*, Fig. 994, Ungarn, aus dem Banat

24/17 *Ebrechtella tricuspidata* (Fabricius, 1775)
as *Thomisus diana*, Fig. 26, Deutschland und Frankreich

24/18 *Epicadus heterogaster* (Guérin, 1829)
as *Eripus heterogaster*, Fig. 984, Brasilien

24/19 *E. heterogaster* (Guérin, 1829)
as *Eripus heterogaster*, Fig. 985, Brasilien

24/20 *Heriaeus orientalis* Simon, 1918
as *Thomisus hirtus*, Fig. 275, Italien und Griechenland

24/21 *H. orientalis* Simon, 1918
as *Thomisus hirtus*, Fig. 276, Italien und Griechenland

24/22 *Misumena vatia* (Clerck, 1757)
as *Thomisus calycinus*, Fig. 283, Ganz Deutschland

24/23 *M. vatia* (Clerck, 1757)
as *Thomisus calycinus*, Fig. 284, Ganz Deutschland

24/24 *M. vatia* (Clerck, 1757)
as *Thomisus citreus*, Fig. 32, Fast überall in Europa

24/25 *M. vatia* (Clerck, 1757)
as *Thomisus pratensis*, Fig. 33, Ganz Bayern

24/26 *M. vatia* (Clerck, 1757)
as *Thomisus devius*, Fig. 997, Im Banat in Ungarn

24/27 *Ozyptila atomaria* (Panzer, 1800)
as *Xysticus horticola*, Fig. 296, Südliches Deutschland, bei Regensburg

24/28 *O. atomaria* (Panzer, 1800)
as *Xysticus horticola*, Fig. 297, Südliches Deutschland, bei Regensburg

24/29 *O. atomaria* (Panzer, 1800)
as *Xysticus horticola*, Fig. 298, Südliches Deutschland, bei Regensburg

24/30 *O. atomaria* (Panzer, 1800)
as *Xysticus horticola*, Fig. 299, Südliches Deutschland, bei Regensburg

24/31 *O. brevipes* (Hahn, 1826)
as *Thomisus brevipes*, Fig. 25, Hiesige Nürnberger Gegend

24/32 *O. confluens* (C. L. Koch, 1845)
as *Xysticus confluens*, Fig. 1001, Griechenland

24/33 *O. praticola* (C. L. Koch, 1837)
as *Xysticus praticola*, Fig. 300, Wahrscheinlich überall in Deutschland

24/34 *O. praticola* (C. L. Koch, 1837)
as *Xysticus praticola*, Fig. 301, Wahrscheinlich überall in Deutschland

24/35 *Pistius truncatus* (Pallas, 1772)
as *Thomisus horridus*, Fig. 280, Griechenland

24/36 *Platythomisus octomaculatus* (C. L. Koch, 1845)
as *Thomisus 8-maculatus*, Fig. 990, Ostindien

24/37 *Psammitis sabulosa* (Hahn, 1832)
as *Xysticus sabulosus*, Fig. 1000

25/1 *P. sabulosa* (Hahn, 1832)
as *Thomisus sabulosus*, Fig. 24, Umgebungen Nürnbergs

25/2 *P. sabulosa* (Hahn, 1832)
as *Xysticus sabulosus*, Fig. 999

25/3 *Runcinia grammica* (C. L. Koch, 1837)
as *Thomisus lateralis*, Fig. 277, Griechenland

25/4 *R. grammica* (C. L. Koch, 1837)
as *Xysticus grammicus*, Fig. 285, Um Nauplia in Griechenland

25/5 *R. grammica* (C. L. Koch, 1837)
as *Thomisus cerinus*, Fig. 996, Ungarn, aus der Gegend von Oravitza im Banat

25/6 *Synema globosum* (Fabricius, 1775)
as *Thomisus globosus*, Fig. 28, Deutschland und Frankreich

25/7 *Thomisus capparinus*
family placed by genus, Fig. 995, Ungarn, aus dem Banat

25/8 *T. dauci*
Fig. 27, Deutschland und Frankreich

25/9 *T. onustus* Walckenaer, 1805
as *Thomisus diadema*, Fig. 281, Italien und Griechenland

25/10 *Thomisus onustus* Walckenaer, 1805
as *Thomisus diadema*, Fig. 282, Italien und Griechenland

25/11 *T. onustus* Walckenaer, 1805
as *Thomisus diadema*, Fig. 37, Bei Neapel

25/12 *Tmarus piger* (Walckenaer, 1802)
as *Xysticus cuneolus*, Fig. 302, Zweibrücken in Rheinbayern

25/13 *Xysticus audax* (Schränk, 1803)
Fig. 1005, Deutschland

25/14 *X. audax* (Schränk, 1803)
Fig. 1006, Deutschland

25/15 *X. audax* (Schränk, 1803)
Fig. 1007, Deutschland

25/16 *X. audax* (Schränk, 1803)
Fig. 1008, Deutschland

25/17 *X. audax* (Schränk, 1803)
as *Thomisus pini*, Fig. 23, Hiesige (Nürnberger) Gegend

25/18 *X. audax* (Schränk, 1803)
as *Xysticus cinereus*, Fig. 290, Bei Weidhaus an der Böhmischen Grenze

25/19 *X. audax* (Schränk, 1803)
as *Thomisus lateralis*, Fig. 31, Hiesige Gegend

25/20 *X. bifasciatus* C. L. Koch, 1837
as *Xysticus lanio*, Fig. 1010, Bayern, auch in Böhmen bei Carlsbad

25/21 *X. bifasciatus* C. L. Koch, 1837
as *Xysticus lanio*, Fig. 1011, Bayern, auch in Böhmen bei Carlsbad

25/22 *X. bifasciatus* C. L. Koch, 1837
Fig. 286, Bergige Gegenden, hiesige Gegend

25/23 *X. bifasciatus* C. L. Koch, 1837
Fig. 287, Bergige Gegenden, hiesige Gegend

25/24 *X. bifasciatus* C. L. Koch, 1837
Fig. 288, Bergige Gegenden, hiesige Gegend

25/25 *X. cristatus* (Clerck, 1757)
as *Thomisus viaticus*, Fig. 29, Ganz Deutschland, Italien, Frankreich, Schweden

25/26 *X. kochi* Thorell, 1872
as *Xysticus viaticus*, Fig. 1003, Schweden, Deutschland und Frankreich

25/27 *X. kochi* Thorell, 1872
as *Xysticus viaticus*, Fig. 1004, Schweden, Deutschland und Frankreich

25/28 *X. lanio* C. L. Koch, 1835
Fig. 1009, Bayern, auch in Böhmen bei Carlsbad

25/29 *X. luctans* (C. L. Koch, 1845)
as *Thomisus luctans*, Fig. 998, Pennsylvanien

25/30 *X. thessalicus* Simon, 1916
as *Xysticus graecus*, Fig. 1002, Griechenland und Ungarn

25/31 *X. ulmi* (Hahn, 1831)
as *Thomisus ulmi*, Fig. 30, Hiesige Nürnberger Gegend

Salticidae

25/32 *Admestina tibialis* (C. L. Koch, 1846)
as *Maecia tibialis*, Fig. 1333, Pennsylvanien

25/33 *Aelurillus v-insignitus* (Clerck, 1757)
as *Salticus quinquepartitus*, Fig. 126, Deutschland, Frankreich und Schweden

25/34 *A. v-insignitus* (Clerck, 1757)
as *Euophrys quinquepartitus*, Fig. 1296, Schweden, Deutschland, Frankreich

25/35 *Alcmena amabilis* C. L. Koch, 1846
Fig. 1228, Mexico

25/36 *A. psittacina* C. L. Koch, 1846
Fig. 1227, Brasilien

25/37 *Amycus igneus* (Perty, 1833)
Fig. 1232, Brasilien

26/1 *A. spectabilis* C. L. Koch, 1846
Fig. 1233, Brasilien

26/2 *Aphirape ancilla* (C. L. Koch, 1846)
as *Euophrys ancilla*, Fig. 1254, San João del Rey in Brasilien

26/3 *A. brunnescens* (C. L. Koch, 1846)
as *Euophrys brunnescens*, Fig. 1257, Brasilien

26/4 *A. incomta* (C. L. Koch, 1846)
as *Euophrys incomta*, Fig. 1258, San João del Rey in Brasilien

26/5 *Artabrus erythrocephalus* (C. L. Koch, 1846)
as *Plexippus erythrocephalus*, Fig. 1164, Java

26/6 *Asaracus megacephalus* C. L. Koch, 1846
Fig. 1236, Brasilien

26/7 *Asianellus festivus* (C. L. Koch, 1834)
as *Euophrys striata*, Fig. 1272, Deutschland

26/8 *A. festivus* (C. L. Koch, 1834)
as *Euophrys striata*, Fig. 1273, Deutschland

26/9 *Attulus caricis* (Westring, 1861)
as *Euophrys atellana*, Fig. 1302, Bayern, in den Gebirgen der Hochlande

26/10 *A. floricola* (C. L. Koch, 1837)
as *Euophrys floricola*, Fig. 1301, Bayern, in den Donau[unleserlich] bei Regensburg

26/11 *A. littoralis* (Hahn, 1832)
as *Salticus littoralis*, Fig. 53, Hiesige Gegend, am Rande ausgetrockneter Teiche

26/12 *A. pubescens* (Fabricius, 1775)
as *Euophrys pubescens*, Fig. 1278, überall

26/13 *A. pubescens* (Fabricius, 1775)
as *Euophrys pubescens*, Fig. 1279, überall

26/14 *Attulus pubescens* (Fabricius, 1775)
as *Euophrys pratricula*, Fig. 1299, Bajern (Donauagegenden, Oberpfalz)

26/15 *A. pubescens* (Fabricius, 1775)
as *Salticus pubescens*, Fig. 51, Deutschland, Frankreich und Schweden

26/16 *A. rupicola* (C. L. Koch, 1837)
as *Euophrys rupicola*, Fig. 1286, Niedere Alpen im südlichen Deutschland

26/17 *A. terebratus* (Clerck, 1757)
as *Euophrys terebrata*, Fig. 1280, Salzburgischen (vermuthlich Alpengegenden)

26/18 *A. terebratus* (Clerck, 1757)
as *Euophrys terebrata*, Fig. 1281, Salzburgischen (vermuthlich Alpengegenden)

26/19 *Ballus chalybeius* (Walckenaer, 1802)
as *Marpissa brevipes*, Fig. 1126, In hiesiger Gegend

26/20 *B. chalybeius* (Walckenaer, 1802)
as *Attus heterophthalmus*, Fig. 1308, In hiesiger Gegend

26/21 *B. chalybeius* (Walckenaer, 1802)
as *Salticus brevipes*, Fig. 56, Ganz Bayern, vermuthlich auch mehrere Gegenden Deutschlands

26/22 *Bavia capistrata* (C. L. Koch, 1846)
as *Maecia capistrata*, Fig. 1331, Bintang

26/23 *Beata jubata* (C. L. Koch, 1846)
as *Eris jubata*, Fig. 1238, St. Thomas in Westindien

26/24 *Breda bistriata* (C. L. Koch, 1846)
as *Marpissa bistriata*, Fig. 1137, San Paulo in Südbrasilien

26/25 *B. milvina* (C. L. Koch, 1846)
as *Marpissa milvina*, Fig. 1131, Brasilien, Bahia

26/26 *Carrhotus albolineatus* (C. L. Koch, 1846)
as *Plexippus albolineatus*, Fig. 1167, Java

26/27 *C. viduus* (C. L. Koch, 1846)
as *Plexippus viduus*, Fig. 1166, Java und Insel Bintang in Hinterindien

26/28 *C. xanthogramma* (Latreille, 1819)
as *Dendryphantes mucidus*, Fig. 1149, Ungarn, Banat

26/29 *Ciris rotundata* C. L. Koch, 1846
Fig. 1339, Bintang

26/30 *Cocalus concolor* C. L. Koch, 1846
Fig. 1230, Insel Bintang

26/31 *Colonus pallidus* (C. L. Koch, 1846)
as *Alcmena pallida*, Fig. 1229, Brasilien, Para

26/32 *C. sylvanus* (Hentz, 1846)
as *Amycus flavolineatus*, Fig. 1234, Mexico

26/33 *Corythalia latipes* (C. L. Koch, 1846)
as *Euophrys latipes*, Fig. 1269, Brasilien

26/34 *Cosmophasis thalassina* (C. L. Koch, 1846)
as *Plexippus thalassinus*, Fig. 1184, Die Insel Bintang, in Hinterindien

26/35 *Dendryphantes auratus* C. L. Koch, 1837
Fig. 1154, In der hiesigen Gegend

26/36 *D. bimaculatus* C. L. Koch, 1846
Fig. 1153, Neapel

26/37 *D. hastatus* (Clerck, 1757)
Fig. 1145, In jungen Föhrenwäldern

27/1 *D. hastatus* (Clerck, 1757)
Fig. 1146, In jungen Föhrenwäldern

27/2 *D. hastatus* (Clerck, 1757)
as *Salticus pini*, Fig. 45, Deutschland und Schweden

27/3 *D. honestus* (C. L. Koch, 1846)
as *Icelus honestus*, Fig. 1226, Brasilien

27/4 *D. mendicus* (C. L. Koch, 1846)
as *Callihera mendica*, Fig. 1120, Westindien

27/5 *D. mordax* (C. L. Koch, 1846)
as *Hyllus mordax*, Fig. 1219, Montevideo

27/6 *D. mordax* (C. L. Koch, 1846)
as *Euophrys jucunda*, Fig. 1252, Montevideo

27/7 *D. nobilis* (C. L. Koch, 1846)
as *Hyllus nobilis*, Fig. 1220

27/8 *D. pugnax* (C. L. Koch, 1846)
as *Hyllus pugnax*, Fig. 1221, Mexiko

27/9 *D. rudis* (Sundevall, 1833)
as *Dendryphantes medius*, Fig. 1141, In Nadelholzwaldungen der hiesigen Gegend

27/10 *D. rudis* (Sundevall, 1833)
as *Dendryphantes medius*, Fig. 1142, In Nadelholzwaldungen der hiesigen Gegend

27/11 *D. rudis* (Sundevall, 1833)
as *Dendryphantes medius*, Fig. 1143, In Nadelholzwaldungen der hiesigen Gegend

27/12 *D. strenuus* (C. L. Koch, 1846)
as *Hyllus strenuus*, Fig. 1218, Mexico

27/13 *Eris illustris* C. L. Koch, 1846
Fig. 1239, Puerto Rico

27/14 *E. militaris* (Hentz, 1845)
as *Plexippus albovitatus*, Fig. 1178, Pennsylvanien

27/15 *E. militaris* (Hentz, 1845)
as *Eris aurigera*, Fig. 1237, Pennsylvanien

27/16 *E. militaris* (Hentz, 1845)
as *Euophrys humilis*, Fig. 1262, Pennsylvanien

27/17 *E. rufa* (C. L. Koch, 1846)
as *Plexippus rufus*, Fig. 1180, Pennsylvanien

27/18 *E. tricolor* (C. L. Koch, 1846)
as *Plexippus tricolor*, Fig. 1177, Mexiko

- 27/19** *Euophrys frontalis* (Walckenaer, 1802)
as Attus frontalis, Fig. 1304, Frankreich, Deutschland
- 27/20** *E. frontalis* (Walckenaer, 1802)
as Attus frontalis, Fig. 1305, Frankreich, Deutschland
- 27/21** *E. hamata* C. L. Koch, 1846
Fig. 1265, San João del Rey in Brasilien
- 27/22** *E. leucostigma* C. L. Koch, 1846
Fig. 1256, Brasilien
- 27/23** *E. striolata* (C. L. Koch, 1846)
as Attus striolatus, Fig. 1306, Bei Carlsbad in Böhmen
- 27/24** *Evarcha amabilis* (C. L. Koch, 1846)
as Euophrys amabilis, Fig. 1260, Pennsylvanien
- 27/25** *E. arcuata* (Clerck, 1757)
as Marpissa grossa, Fig. 1125, In hiesiger Gegend
- 27/26** *E. arcuata* (Clerck, 1757)
as Euophrys farinosa, Fig. 1268, Das südliche Deutschland über den Alpen
- 27/27** *E. arcuata* (Clerck, 1757)
as Euophrys arcuata, Fig. 1298, Schweden, Deutschland, Frankreich
- 27/28** *E. arcuata* (Clerck, 1757)
as Euophrys paludicola, Fig. 1300, Bayern, Provinz Oberpfalz
- 27/29** *E. arcuata* (Clerck, 1757)
as Salticus grossipes, Fig. 40, Deutschland und Schweden
- 27/30** *E. falcata* (Clerck, 1757)
as Euophrys falcata, Fig. 1290, Schweden, Deutschland, Frankreich
- 27/31** *E. falcata* (Clerck, 1757)
as Euophrys falcata, Fig. 1291, Schweden, Deutschland, Frankreich
- 27/32** *E. falcata* (Clerck, 1757)
as Euophrys falcata, Fig. 1292, Schweden, Deutschland, Frankreich
- 27/33** *E. falcata* (Clerck, 1757)
as Euophrys falcata, Fig. 1293, Schweden, Deutschland, Frankreich
- 27/34** *E. falcata* (Clerck, 1757)
as Euophrys falcata, Fig. 1294, Schweden, Deutschland, Frankreich
- 27/35** *E. falcata* (Clerck, 1757)
as Euophrys falcata, Fig. 1295, Schweden, Deutschland, Frankreich
- 27/36** *E. falcata* (Clerck, 1757)
as Salticus abietis, Fig. 46, Hiesige Nürnberger Gegend
- 27/37** *E. falcata* (Clerck, 1757)
as Salticus blancardi, Fig. 48, Deutschland, Frankreich, Schweden
- 28/1** *E. flavocincta* (C. L. Koch, 1846)
as Maevia flavocincta, Fig. 1330, Bintang
- 28/2** *E. laetabunda* (C. L. Koch, 1846)
as Euophrys laetabunda, Fig. 1287, Bis jetzt nur bei Erlangen
- 28/3** *E. laetabunda* (C. L. Koch, 1846)
as Euophrys laetabunda, Fig. 1288, Bis jetzt nur bei Erlangen
- 28/4** *E. laetabunda* (C. L. Koch, 1846)
as Euophrys laetabunda, Fig. 1289, Bis jetzt nur bei Erlangen
- 28/5** *E. nigrifrons* (C. L. Koch, 1846)
as Plexippus nigrifrons, Fig. 1172, Bintang
- 28/6** *Freya decorata* (C. L. Koch, 1846)
as Euophrys decorata, Fig. 1248, Brasilien
- 28/7** *F. decorata* (C. L. Koch, 1846)
as Euophrys trifasciata, Fig. 1249, Brasilien
- 28/8** *F. rubiginosa* (C. L. Koch, 1846)
as Euophrys rubiginosa, Fig. 1255, Para
- 28/9** *Frigga coronigera* (C. L. Koch, 1846)
as Euophrys comita, Fig. 1251, Brasilien
- 28/10** *F. coronigera* (C. L. Koch, 1846)
as Euophrys coronigera, Fig. 1266, Brasilien, Para
- 28/11** *F. coronigera* (C. L. Koch, 1846)
as Euophrys hastigera, Fig. 1267, Brasilien
- 28/12** *Gastromicans tessellata* (C. L. Koch, 1846)
as Phidippus. tessellatus, Fig. 1213, San João del Rey in Brasilien
- 28/13** *Heliophanus aeneus* (Hahn, 1832)
as Heliophanus truncorum, Fig. 1309, Schweden, Deutschland, Frankreich
- 28/14** *H. aeneus* (Hahn, 1832)
as Heliophanus truncorum, Fig. 1310, Schweden, Deutschland, Frankreich
- 28/15** *H. aeneus* (Hahn, 1832)
as Salticus aeneus, Fig. 49, Hiesige Nürnberger Gegend
- 28/16** *H. auratus* C. L. Koch, 1835
Fig. 1311, Bayern
- 28/17** *H. auratus* C. L. Koch, 1835
Fig. 1312, Bayern
- 28/18** *H. cupreus* (Walckenaer, 1802)
as Salticus chalybeius, Fig. 127, Deutschland und Frankreich
- 28/19** *H. cupreus* (Walckenaer, 1802)
as Salticus cupreus, Fig. 128, Deutschland und Frankreich
- 28/20** *H. cupreus* (Walckenaer, 1802)
Fig. 1313, überall in Frankreich und Deutschland
- 28/21** *H. cupreus* (Walckenaer, 1802)
Fig. 1314, überall in Frankreich und Deutschland
- 28/22** *H. cupreus* (Walckenaer, 1802)
Fig. 1315, überall in Frankreich und Deutschland
- 28/23** *Heliophanus cupreus* (Walckenaer, 1802)
as Heliophanus metallicus, Fig. 1316, Deutschland
- 28/24** *H. cupreus* (Walckenaer, 1802)
as Heliophanus tricoloratus, Fig. 1323, Bei dem Bade Gastein im Salzburgerischen
- 28/25** *H. cupreus* (Walckenaer, 1802)
as Heliophanus micans, Fig. 1324, Nähe des Bades Gastein im Salzburgerischen
- 28/26** *H. dubius* C. L. Koch, 1835
Fig. 1317, In hiesiger Gegend
- 28/27** *H. dubius* C. L. Koch, 1835
Fig. 1318, In hiesiger Gegend
- 28/28** *H. dubius* C. L. Koch, 1835
as Heliophanus nitens, Fig. 1319, Bei Karlsbad (auf Nadelholzgesträuch)
- 28/29** *H. flavipes* (Hahn, 1832)
Fig. 1320, Deutschland, [Fortsetzung fehlt]
- 28/30** *H. flavipes* (Hahn, 1832)
Fig. 1321, Deutschland, [Fortsetzung fehlt]
- 28/31** *H. flavipes* (Hahn, 1832)
Fig. 1322, Deutschland, [Fortsetzung fehlt]
- 28/32** *H. flavipes* (Hahn, 1832)
as Salticus flavipes, Fig. 50, Hiesige Gegend
- 28/33** *Hentzia mitrata* (Hentz, 1846)
as Maevia sulphurea, Fig. 1327, Pennsylvanien
- 28/34** *H. mitrata* (Hentz, 1846)
as Maevia pallida, Fig. 1334, Pennsylvanien
- 28/35** *Hyllus diardi* (Walckenaer, 1837)
as Plexippus mutillarius, Fig. 1155, Insel Bintang in Hinterindien; Java
- 28/36** *H. diardi* (Walckenaer, 1837)
as Plexippus mutillarius, Fig. 1156, Insel Bintang in Hinterindien; Java
- 28/37** *H. diardi* (Walckenaer, 1837)
as Plexippus lacertosus, Fig. 1157, Java, auch in Hinterindien auf der Insel Bintang
- 29/1** *H. diardi* (Walckenaer, 1837)
as Plexippus lacertosus, Fig. 1158, Java, auch in Hinterindien auf der Insel Bintang
- 29/2** *H. diardi* (Walckenaer, 1837)
as Plexippus janthinus, Fig. 1160, Die Insel Bintang
- 29/3** *H. diardi* (Walckenaer, 1837)
as Plexippus succinctus, Fig. 1161, Die Insel Bintang in Hinterindien
- 29/4** *H. giganteus* C. L. Koch, 1846
Fig. 1216
- 29/5** *H. senegalensis* (C. L. Koch, 1846)
as Plexippus senegalensis, Fig. 1170, Afrika, vom Senegal
- 29/6** *Icius hamatus* (C. L. Koch, 1846)
as Marpissa hamata, Fig. 1132, Neapel
- 29/7** *I. hamatus* (C. L. Koch, 1846)
as Icelus notabilis, Fig. 1225, Neapel
- 29/8** *Leptofreya ambigua* (C. L. Koch, 1846)
as Euophrys ambigua, Fig. 1253, Surinam
- 29/9** *Leptorchestes berolinensis* (C. L. Koch, 1846)
as Salticus berolinensis, Fig. 1103, Bei Berlin
- 29/10** *L. berolinensis* (C. L. Koch, 1846)
as Salticus berolinensis, Fig. 1104, Bei Berlin
- 29/11** *Lurio solennis* (C. L. Koch, 1846)
as Hyllus solennis, Fig. 1217, Columbien, La Guayra
- 29/12** *Macaroeis nidicolens* (Walckenaer, 1802)
as Dendryphantes nebulosus, Fig. 1151, Neapel
- 29/13** *Maevia inclemens* (Walckenaer, 1837)
as Plexippus undatus, Fig. 1183, Pennsylvanien
- 29/14** *M. inclemens* (Walckenaer, 1837)
as Maevia pennicillata, Fig. 1325
- 29/15** *M. inclemens* (Walckenaer, 1837)
as Maevia annulipes, Fig. 1335, Pennsylvanien
- 29/16** *M. micans* C. L. Koch, 1846
Fig. 1336, Bintang
- 29/17** *M. paula* C. L. Koch, 1846
Fig. 1329, Bintang
- 29/18** *Marpissa capensis* C. L. Koch, 1846
Fig. 1140, Vorgebirg der guten Hoffnung
- 29/19** *M. lineata* (C. L. Koch, 1846)
as Maevia lineata, Fig. 1332, Pennsylvanien
- 29/20** *M. muscosa* (Clerck, 1757)
Fig. 1129, Fast überall; in hiesiger Gegend selten
- 29/21** *M. muscosa* (Clerck, 1757)
Fig. 1130, Fast überall; in hiesiger Gegend selten
- 29/22** *M. muscosa* (Clerck, 1757)
as Salticus rumpffii, Fig. 42, Deutschland, Frankreich, Schweden
- 29/23** *Menemerus bivittatus* (Dufour, 1831)
as Marpissa balteata, Fig. 1133, Africa, vom Senegal
- 29/24** *M. bivittatus* (Dufour, 1831)
as Marpissa dissimilis, Fig. 1135, Brasilien; St. Thomas; Columbien
- 29/25** *M. bivittatus* (Dufour, 1831)
as Marpissa dissimilis, Fig. 1136, Brasilien; St. Thomas; Columbien
- 29/26** *M. bivittatus* (Dufour, 1831)
as Marpissa incerta, Fig. 1138, St. Thomas in Westindien
- 29/27** *Menemerus bivittatus* (Dufour, 1831)
as Marpissa discoloria, Fig. 1139, Hinterindien, von der Insel Bintang
- 29/28** *M. semilimbatus* (Hahn, 1829)
as Euophrys vigorata, Fig. 1282, Griechenland
- 29/29** *M. semilimbatus* (Hahn, 1829)
as Euophrys vigorata, Fig. 1283, Griechenland
- 29/30** *Metaphidippus chalcodon* (C. L. Koch, 1846)
as Phidippus chalcodon, Fig. 1214, Brasilien
- 29/31** *Mogrus canescens* (C. L. Koch, 1846)
as Dendryphantes canescens, Fig. 1144, Griechenland
- 29/32** *Myrmarachne albocincta* (C. L. Koch, 1846)
as Salticus albocinctus, Fig. 1105, Pennsylvanien
- 29/33** *M. formicaria* (De Geer, 1778)
as Pyrophorus semirufus, Fig. 1093, Bisher nur in hiesiger Gegend
- 29/34** *M. formicaria* (De Geer, 1778)
as Pyrophorus helveticus, Fig. 1094, Dübendorf in der Schweiz
- 29/35** *M. formicaria* (De Geer, 1778)
as Pyrophorus helveticus, Fig. 1095, Dübendorf in der Schweiz
- 29/36** *M. formicaria* (De Geer, 1778)
as Pyrophorus siciliensis, Fig. 1096, Sicilien
- 29/37** *M. formicaria* (De Geer, 1778)
as Pyrophorus tyrolensis, Fig. 1097, Tyrol
- 30/1** *M. formicaria* (De Geer, 1778)
as Pyrophorus tyrolensis, Fig. 1098, Tyrol
- 30/2** *M. formicaria* (De Geer, 1778)
as Salticus formicarius, Fig. 1101, Unbekannt
- 30/3** *M. formicaria* (De Geer, 1778)
as Salticus formicarius, Fig. 1102, Unbekannt
- 30/4** *M. kochi* Reimoser, 1925
as Janus melanocephalus, Fig. 1092, Bintang in Hinterindien
- 30/5** *Naphrys pulex* (Hentz, 1846)
as Euophrys offuscata, Fig. 1263, Pennsylvanien
- 30/6** *Opisthoncus sexmaculatus* (C. L. Koch, 1846)
as Plexippus sexmaculatus, Fig. 1179, Westliches Neuholland
- 30/7** *Pachomius ministerialis* (C. L. Koch, 1846)
as Phiale ministerialis, Fig. 1247, Südamerika, Columbien
- 30/8** *Paraphidippus aurantius* (Lucas, 1833)
as Plexippus orichalcus, Fig. 1174, Mexiko
- 30/9** *P. aurantius* (Lucas, 1833)
as Plexippus aureus, Fig. 1175, Mexiko
- 30/10** *P. fulgidus* (C. L. Koch, 1846)
as Phidippus fulgidus, Fig. 1208, Mexiko
- 30/11** *P. fuscipes* (C. L. Koch, 1846)
as Phidippus fuscipes, Fig. 1209, Mexiko
- 30/12** *P. nitens* (C. L. Koch, 1846)
as Phidippus nitens, Fig. 1210, Mexiko
- 30/13** *Parnaenus cyanidens* (C. L. Koch, 1846)
as Phidippus cyanidens, Fig. 1211, Para in Brasilien
- 30/14** *P. metallicus* (C. L. Koch, 1846)
as Phidippus metallicus, Fig. 1207, Brasilien
- 30/15** *Pelegriana galathea* (Walckenaer, 1837)
as Euophrys leucophaea, Fig. 1261, Pennsylvanien
- 30/16** *Pellenes tripunctatus* (Walckenaer, 1802)
as Euophrys crucifera, Fig. 1270, Deutschland und Schweden
- 30/17** *P. tripunctatus* (Walckenaer, 1802)
as Euophrys crucifera, Fig. 1271, Deutschland und Schweden
- 30/18** *P. tripunctatus* (Walckenaer, 1802)
as Euophrys quinquepartita, Fig. 1297, Schweden, Deutschland, Frankreich
- 30/19** *P. tripunctatus* (Walckenaer, 1802)
as Salticus crux, Fig. 52, Auf dem St. Hans-Georgenberg bei Hersbruck
- 30/20** *Phiale crocea* C. L. Koch, 1846
Fig. 1242, Brasilien, aus der Provinz Para
- 30/21** *P. gratiosa* C. L. Koch, 1846
as Plexippus selectus, Fig. 1163, Brasilien
- 30/22** *P. gratiosa* C. L. Koch, 1846
Fig. 1240, Brasilien
- 30/23** *P. gratiosa* C. L. Koch, 1846
Fig. 1241, Brasilien
- 30/24** *P. gratiosa* C. L. Koch, 1846
as Phiale rufoguttata, Fig. 1245, Brasilien
- 30/25** *P. gratiosa* C. L. Koch, 1846
as Phiale berina, Fig. 1246, Brasilien
- 30/26** *P. guttata* (C. L. Koch, 1846)
as Plexippus guttatus, Fig. 1159, Bahia
- 30/27** *P. guttata* (C. L. Koch, 1846)
as Plexippus flavoguttatus, Fig. 1162, Para in Brasilien
- 30/28** *P. mimica* (C. L. Koch, 1846)
as Plexippus mimicus, Fig. 1173, Brasilien
- 30/29** *P. mimica* (C. L. Koch, 1846)
as Euophrys bella, Fig. 1250, Brasilien
- 30/30** *P. virgo* C. L. Koch, 1846
Fig. 1244, Surinam
- 30/31** *Phidippus arrogans* C. L. Koch, 1846
Fig. 1212, Brasilien
- 30/32** *P. audax* (Hentz, 1845)
as Phidippus variegatus, Fig. 1186, Nordamerika, Neu Orleans
- 30/33** *P. audax* (Hentz, 1845)
as Phidippus smaragdifer, Fig. 1188, Neu-Orleans
- 30/34** *P. audax* (Hentz, 1845)
as Phidippus togatus, Fig. 1189, Pennsylvanien

30/35 *Phidippus audax* (Hentz, 1845)
as Phidippus alchymista, Fig. 1190, Pennsylvanien

30/36 *P. audax* (Hentz, 1845)
as Phidippus rufimanus, Fig. 1191, Nordamerika, Neuyork

30/37 *P. audax* (Hentz, 1845)
as Phidippus lunulatus, Fig. 1192, Nordamerika, Carolina

31/1 *P. audax* (Hentz, 1845)
as Phidippus dubiosus, Fig. 1193, Pennsylvanien

31/2 *P. audax* (Hentz, 1845)
as Phidippus mundulus, Fig. 1195, Pennsylvanien

31/3 *P. audax* (Hentz, 1845)
as Phidippus mundulus, Fig. 1196

31/4 *P. audax* (Hentz, 1845)
as Phidippus personatus, Fig. 1199, Pennsylvanien

31/5 *P. audax* (Hentz, 1845)
as Phidippus elegans, Fig. 1200, Pennsylvanien

31/6 *P. audax* (Hentz, 1845)
as Phidippus electus, Fig. 1201, Pennsylvanien

31/7 *P. audax* (Hentz, 1845)
as Phidippus concinnatus, Fig. 1202, Baltimore, Pennsylvanien

31/8 *P. cardinalis* (Hentz, 1845)
as Plexippus bivittatus, Fig. 1181, Pennsylvanien

31/9 *P. clarus* Keyserling, 1885
as Phidippus testaceus, Fig. 1215, Pennsylvanien

31/10 *P. insignarius* C. L. Koch, 1846
as Phidippus auctus, Fig. 1204, Pennsylvanien

31/11 *P. insignarius* C. L. Koch, 1846
Fig. 1206, Pennsylvanien

31/12 *P. mystaceus* (Hentz, 1846)
as Phidippus asinarius, Fig. 1197

31/13 *P. otiosus* (Hentz, 1846)
as Phidippus carolinus, Fig. 1194, Nordamerika, Carolina

31/14 *P. princeps* (G. W. Peckham & E. G. Peckham, 1883)
as Phidippus castrensis, Fig. 1198, Pennsylvanien

31/15 *P. regius* C. L. Koch, 1846
as Phidippus purpurifer, Fig. 1187, Nordamerika

31/16 *P. regius* C. L. Koch, 1846
Fig. 1203, Cuba

31/17 *P. whitmani* G. W. Peckham & E. G. Peckham, 1909
as Phidippus paludatus, Fig. 1205, Carolina

31/18 *P. whitmani* G. W. Peckham & E. G. Peckham, 1909
as Phiale modesta, Fig. 1243, Pennsylvanien

31/19 *Philaeus chrysops* (Poda, 1761)
as Phila haemorrhoea, Fig. 1121, Griechenland

31/20 *P. chrysops* (Poda, 1761)
as Phila haemorrhoea, Fig. 1122, Griechenland

31/21 *P. chrysops* (Poda, 1761)
as Phila haemorrhoea, Fig. 1123, Griechenland

31/22 *P. chrysops* (Poda, 1761)
as Phila sanguinolenta, Fig. 1124

31/23 *P. chrysops* (Poda, 1761)
as Dendryphantes dorsatus, Fig. 1147, Italien

31/24 *P. chrysops* (Poda, 1761)
as Dendryphantes xanthomelas, Fig. 1148, Neapel

31/25 *P. chrysops* (Poda, 1761)
as Dendryphantes leucomelas, Fig. 1150, Neapel

31/26 *P. chrysops* (Poda, 1761)
as Dendryphantes lanipes, Fig. 1152

31/27 *P. chrysops* (Poda, 1761)
as Salticus sanguinolentus, Fig. 39, Südeuropa

31/28 *Phintella vittata* (C. L. Koch, 1846)
as Plexippus vittatus, Fig. 1185, Bintang

31/29 *P. vittata* (C. L. Koch, 1846)
as Hyllus alternans, Fig. 1222, Ostindien, Puloloz

31/30 *Phintelloides versicolor* (C. L. Koch, 1846)
as Plexippus versicolor, Fig. 1165, Bintang

31/31 *P. versicolor* (C. L. Koch, 1846)
as Maevia picta, Fig. 1328, Insel Bintang in Hinterindien

31/32 *Phlegra fasciata* (Hahn, 1826)
as Euophrys aprica, Fig. 1274, In hiesiger Gegend

31/33 *P. fasciata* (Hahn, 1826)
as Salticus fasciatus, Fig. 41, Um München und Nürnberg

31/34 *P. lineata* (C. L. Koch, 1846)
as Euophrys lineata, Fig. 1303, Griechenland

31/35 *Platycreptus undatus* (De Geer, 1778)
as Marpissa undata, Fig. 1127, Nordamerika, Pennsylvanien

31/36 *P. undatus* (De Geer, 1778)
as Marpissa conspersa, Fig. 1128, Nordamerika, Pennsylvanien

31/37 *P. undatus* (De Geer, 1778)
as Marpissa varia, Fig. 1134, Pennsylvanien

32/1 *Plexippus hepaticus* C. L. Koch, 1846
Fig. 1171, Ostindien, Puloloz

32/2 *P. paykulli* (Audouin, 1826)
as Plexippus ligo, Fig. 1168, Afrika, am Senegal

32/3 *P. paykulli* (Audouin, 1826)
as Plexippus ligo, Fig. 1169, Egypten

32/4 *P. paykulli* (Audouin, 1826)
as Euophrys vetusta, Fig. 1264, St. Thomas

32/5 *P. seladonicus* C. L. Koch, 1846
Fig. 1176, Mexiko

32/6 *P. taeniatus* C. L. Koch, 1846
Fig. 1182, Mexiko

32/7 *Psecas cyaneus* (C. L. Koch, 1846)
as Cocalus cyaneus, Fig. 1231, Surinam

32/8 *P. sumptuosus* (Perry, 1833)
as Thiania sumptuosa, Fig. 1224, Brasilien

32/9 *Pseudeuophrys erratica* (Walckenaer, 1826)
as Euophrys tigrina, Fig. 1275, Deutschland (Oberpfalz, Böhmen)

32/10 *P. erratica* (Walckenaer, 1826)
as Euophrys tigrina, Fig. 1276, Deutschland (Oberpfalz, Böhmen)

32/11 *P. erratica* (Walckenaer, 1826)
as Euophrys tigrina, Fig. 1277, Deutschland (Oberpfalz, Böhmen)

32/12 *P. erratica* (Walckenaer, 1826)
as Salticus agilis, Fig. 54, Um München und in hiesiger Nürnberger Gegend

32/13 *P. erratica* (Walckenaer, 1826)
as Salticus gracilis, Fig. 55, Hiesige Gegend, in Wäldern

32/14 *Pseudicius encarpatus* (Walckenaer, 1802)
as Calliethera pulchella, Fig. 1115, Bayern

32/15 *P. encarpatus* (Walckenaer, 1802)
as Calliethera ambigua, Fig. 1116, Bayern, bei Regensburg

32/16 *P. encarpatus* (Walckenaer, 1802)
as Salticus tigrinus, Fig. 47, Bei München und Landshut

32/17 *Rhene albiger*a (C. L. Koch, 1846)
as Rhanis albiger, Fig. 1341, Bintang

32/18 *R. flavigera* (C. L. Koch, 1846)
as Rhanis flavigera, Fig. 1340, Bintang

32/19 *R. nigrita* (C. L. Koch, 1846)
as Rhanis nigrita, Fig. 1342, Bintang

32/20 *Salticus cingulatus* (Panzer, 1796)
as Calliethera scetica, Fig. 1106, In fast ganz Europa

32/21 *S. cingulatus* (Panzer, 1796)
as Calliethera scetica, Fig. 1107, In fast ganz Europa

32/22 *S. scenicus* (Clerck, 1757)
as Calliethera histronica, Fig. 1110, In hiesiger Gegend, auf Steinhäufen und an Felsen

32/23 *S. scenicus* (Clerck, 1757)
as Calliethera histronica, Fig. 1111, In hiesiger Gegend, auf Steinhäufen und an Felsen

32/24 *S. scenicus* (Clerck, 1757)
as Calliethera aulica, Fig. 1118, Pennsylvanien

32/25 *S. scenicus* (Clerck, 1757)
as Calliethera aulica, Fig. 1119, Pennsylvanien

32/26 *S. scenicus* (Clerck, 1757)
Fig. 43, Fast ganz Europa

32/27 *S. scenicus* (Clerck, 1757)
Fig. 44, Fast ganz Europa

32/28 *S. tricinatus* (C. L. Koch, 1846)
as Calliethera trincta, Fig. 1117, Buchara

32/29 *S. zebraneus* (C. L. Koch, 1837)
as Calliethera zebranea, Fig. 1108, In hiesiger Gegend selten, häufig im Salzburgischen

32/30 *S. zebraneus* (C. L. Koch, 1837)
as Calliethera zebranea, Fig. 1109, In hiesiger Gegend selten, häufig im Salzburgischen

32/31 *S. zebraneus* (C. L. Koch, 1837)
as Calliethera tenera, Fig. 1112

32/32 *S. zebraneus* (C. L. Koch, 1837)
as Calliethera tenera, Fig. 1113

32/33 *S. zebraneus* (C. L. Koch, 1837)
as Calliethera varia, Fig. 1114, In hiesiger Gegend

32/34 *Saphrys rapida* (C. L. Koch, 1846)
as Euophrys rapida, Fig. 1259, Chile

32/35 *Sassacus cyaneus* (Hentz, 1846)
as Maevia chrysea, Fig. 1337, Pennsylvanien

32/36 *Sittisax saxicola* (C. L. Koch, 1846)
as Euophrys saxicola, Fig. 1284, Oberpfalz (Waldungen der höhern Berge)

32/37 *S. saxicola* (C. L. Koch, 1846)
as Euophrys saxicola, Fig. 1285, Oberpfalz (Waldungen der höhern Berge)

33/1 *Synageles hilarulus* (C. L. Koch, 1846)
as Salticus hilarulus, Fig. 1099, Baiern, Donaugegenden

33/2 *S. hilarulus* (C. L. Koch, 1846)
as Salticus hilarulus, Fig. 1100, Baiern, Donaugegenden

33/3 *Synemosyna formica* Hentz, 1846
as Janus gibberosus, Fig. 1091, Nordamerika, Pennsylvanien

33/4 *Talavera petrensis* (C. L. Koch, 1837)
as Attus petrensis, Fig. 1307, Oberpfalz, bei Schwarzhofen

33/5 *Thiania pulcherrima* C. L. Koch, 1846
Fig. 1223, Ostindien, Puloloz

33/6 *Toxews maxillosus* C. L. Koch, 1846
Fig. 1090, Java

33/7 *Tutelina elegans* (Hentz, 1846)
as Maevia cristata, Fig. 1326, Pennsylvanien

33/8 *T. elegans* (Hentz, 1846)
as Maevia aurlenta, Fig. 1338, Pennsylvanien

33/9 *Vinnius subfasciatus* (C. L. Koch, 1846)
as Amycus subfasciatus, Fig. 1235

PEDIPALPI

Phrynidae

33/10 *Phrynus ceylonicus* C. L. Koch, 1843
as Phrynus Ceylonicus, Fig. 776, Ostindien, Ceylon

33/11 *P. fuscimanus* C. L. Koch, 1847
Fig. 1463, Nordamerika

33/12 *P. lunatus*
family placed by genus, Fig. 596, Ostindien

33/13 *P. marginemaculatus* C.L.Koch, 1840
Fig. 597, Westindien

33/14 *P. nigrimanus* C. L. Koch, 1847
as Phrynus nigrinianus, Fig. 1464, Ostindien

33/15 *P. operculatus* Pocock, 1902
as Phrynus palmatus, Fig. 601, Südamerika

33/16 *P. pumilio* C.L.Koch, 1840
as Phrynus Pumilio, Fig. 602, Brasilien

33/17 *P. reniformis*
family placed by genus, Fig. 600, Brasilien

33/18 *P. variegatus* Perry, 1833
Fig. 599, Brasilien

Phrynichidae

33/19 *Damon medius* (Herbst, 1797)
as Phrynus medius, Fig. 598, Amerika

Thelyphonidae

33/20 *Mastigoproctus giganteus* (Lucas, 1835)
as Thelyphonus giganteus, Fig. 767, Mexiko

33/21 *M. giganteus* (Lucas, 1835)
as Thelyphonus giganteus, Fig. 768, Mexiko

33/22 *M. proscorpio* (Latreille, 1806)
as Thelyphonus Proscorpio, Fig. 771, Ostindien, Java

33/23 *Thelyphonus antillanus* C. L. Koch, 1843
as Thelyphonus Antillanus, Fig. 773, St. Domingo

33/24 *T. australianus* C. L. Koch, 1843
as Thelyphonus Australianus, Fig. 775, Neu-Holland

33/25 *T. brasilianus* C. L. Koch, 1843
as Thelyphonus Brasilianus, Fig. 770, Brasilien

33/26 *T. linganus* C. L. Koch, 1843
as Thelyphonus Linganus, Fig. 774, Ostindien, Linga

33/27 *T. manilanus* C. L. Koch, 1843
as Thelyphonus Manilanus, Fig. 772, Manila

33/28 *T. ruftipes* Lucas, 1835
Fig. 769, Java

SCORPIONES

Buthidae

33/29 *Androctonus aeneas* C. L. Koch, 1839
as Androctonus Aeneas, Fig. 432, Nördliches Afrika

33/30 *A. australis* (Linnaeus, 1758)
as Androctonus Priamas, Fig. 366, Java

33/31 *A. bicolor* Ehrenberg, 1828
Fig. 621, Syrien

33/32 *A. citrinus* (Hemprich & Ehrenberg, 1828)
Fig. 965, Oberägypten

33/33 *A. Diomedes*
Fig. 485, ?

33/34 *A. Hector*
Fig. 433, Nördliches Afrika

33/35 *A. Iros*
Fig. 401, Das mittägige Afrika

33/36 *A. Margarelon*
Fig. 367, Unbekannt

33/37 *A. melanophysa* (Hemprich & Ehrenberg, 1828)
Fig. 966, Unterägypten, Lybien, in den Gebirgen des Sinai

34/1 *A. Pandarus*
Fig. 402, Sierra Leona

34/2 *A. Panopeus*
Fig. 418, ?

34/3 *A. peloponnensis* C. L. Koch, 1836
as Androctonus peloponensis, Fig. 967

34/4 *A. stenus*
Fig. 527, Constantinopel

34/5 *A. Thesandrus*
Fig. 486, das Vorgebirg der guten Hoffnung

34/6 *A. thoas*
Fig. 526, Afrika

34/7 *A. Troilus*
Fig. 353, Ostindien

34/8 *Buthacus leptochelys* (Hemprich & Ehrenberg, 1829)
as Androctonus leptochelys, Fig. 964, Arabien, in den Gebirgen des Sinai

34/9 *Buthus ajax* (C. L. Koch, 1839)
as Androctonus Ajax, Fig. 467, Spanien

34/10 *B. costimanus*
family placed by genus, Fig. 266, Java

34/11 *B. defensor*
family placed by genus, Fig. 254, Mexiko

34/12 *B. fulvipes*
family placed by genus, Fig. 278, Java

34/13 *B. balius* (C. L. Koch, 1839)
as Androctonus Halius, Fig. 383, Portugal

34/14 *B. heros*
family placed by genus, Fig. 253, Ungewiss; wahrscheinlich Afrika

34/15 *Buthus longinianus*
family placed by genus, Fig. 595, Afrika

34/16 *B. occitanus* (Amoreux, 1789)
as Androctonus Eurialus, Fig. 448, Frankreich (Heimat nicht angegeben)

34/17 *B. occitanus* (Amoreux, 1789)
as Androctonus Eurilochius, Fig. 449, Heimat nicht angegeben

34/18 *B. paris* (C. L. Koch, 1839)
as Androctonus Paris, Fig. 352, Algier

34/19 *B. paris* (C. L. Koch, 1839)
as Androctonus Clytoneus, Fig. 384, Afrika

34/20 *B. reticulatus*
family placed by genus, Fig. 265, Java

34/21 *B. setosus* C.L.Koch, 1841
Fig. 657

34/22 *B. testaceus*
Fig. 342, Algier

34/23 *B. tunetatus* (Herbst, 1800)
as Androctonus tunetanus, Fig. 968, Aegypten

34/24 *Centruroides gracilis* (Latreille, 1804)
as Tityus macrurus, Fig. 859, Mexico

34/25 *C. gracilis* (Latreille, 1804)
as Tityus congener, Fig. 860, Amerika

34/26 *C. gracilis* (Latreille, 1804)
as Tityus nebulosus, Fig. 862, unbekannt

34/27 *C. gracilis* (Latreille, 1804)
as Tityus denticulatus, Fig. 870

34/28 *C. griseus* (C. L. Koch, 1844)
as Tityus griseus, Fig. 872, Westindien, St. Thomas

34/29 *C. infamatus* (C. L. Koch, 1844)
as Tityus infamatus, Fig. 873, unbekannt

34/30 *Centruroides galbinus*
family placed by genus, Fig. 320, Unbekannt

34/31 *Hottentotta hottentotta* (Fabricius, 1787)
as Tityus hottentotta, Fig. 863, Sierra Leona

34/32 *Jaguajir agamemnon* (C. L. Koch, 1839)
as Androctonus agamemnon, Fig. 506, Brasilien

34/33 *Leiurus quinquestriatus* (Ehrenberg, 1828)
as Androctonus quinquestriatus, Fig. 622

34/34 *Lychas americanus* C. L. Koch, 1845
Fig. 961, Amerika

34/35 *L. maculatus*
family placed by genus, Fig. 960

34/36 *L. marmoreus* (C. L. Koch, 1844)
as Tityus marmoreus, Fig. 868, Ungewiss

34/37 *L. mucronatus* (Fabricius, 1798)
as Tityus mucronatus, Fig. 858, Java

35/1 *L. mucronatus* (Fabricius, 1798)
as Tityus varius, Fig. 864, Java

35/2 *L. paraensis* C. L. Koch, 1845
Fig. 963, Brasilien, Para

35/3 *L. scutillus* C. L. Koch, 1845
Fig. 962, Ostindien, die Insel Bintang

35/4 *Mesobuthus eupeus* (C. L. Koch, 1839)
as Androctonus Eupheus, Fig. 419, Sehr wahrscheinlich die Gegenden des Caucasus

35/5 *M. eupeus* (C. L. Koch, 1839)
as Androctonus Thersites, Fig. 466, ?

35/6 *M. gibbosus* (Brullé, 1832)
as Androctonus peloponnensis, Fig. 191, Griechenland

35/7 *Scorpius rufus*
family placed by genus, Fig. 245, Zweifelhaf, wahrscheinlich Ungarn

35/8 *Tityus*
family placed by genus, Fig. 852, Amerika

35/9 *T. aethiops* C. L. Koch, 1844
Fig. 856, Java

35/10 *T. arrogans* C. L. Koch, 1844
Fig. 865, Brasilien

35/11 *T. bahiensis* (Perty, 1833)
Fig. 190, Brasilien

35/12 *T. carinatus* C. L. Koch, 1844
as Tityus scarinatus, Fig. 851, Amerika, und sehr wahrscheinlich Mexico

35/13 *T. clathratus* C. L. Koch, 1844
Fig. 861, Das Kap der guten Hoffnung

35/14 *T. ducalis* C. L. Koch, 1844
Fig. 869, Mexico

35/15 *T. fallax* C. L. Koch, 1844
Fig. 850, Afrika

35/16 *T. fatalis* C. L. Koch, 1844
Fig. 867

35/17 *T. longimanus* C. L. Koch, 1844
as Tityus lojigimanus, Fig. 857, Java

35/18 *T. perfidus* C. L. Koch, 1844
Fig. 866

35/19 *T. serenus* C. L. Koch, 1844
Fig. 871, unbekannt

35/20 *T. striatus* C. L. Koch, 1844
Fig. 853, Afrika

35/21 *Uroplectes lineatus* (C. L. Koch, 1844)
as Tityus lineatus, Fig. 854, Das Kap der guten Hoffnung

35/22 *U. variegatus* (C. L. Koch, 1844)
as Tityus variegatus, Fig. 855, Das Kap der guten Hoffnung

Chactidae

35/23 *Brotheas angustus* C.L.Koch, 1841
Fig. 658, Südliches Russland

35/24 *B. bonariensis* C. L. Koch, 1842
as Brotheas Bonariensis, Fig. 762, Südamerika, La Plata

35/25 *B. erythroductylus* C. L. Koch, 1842
Fig. 764, Brasilien

35/26 *B. Maurus*
family placed by genus, Fig. 319, Cayenne

35/27 *B. nigrocinctus* C. L. Koch, 1842
Fig. 763, Unbekannt

Euscorpidae

35/28 *Alpiscorpius germanus* (C.L.Koch, 1837)
as Scorpius Germanus, Fig. 250, Das südliche Tyrol, auch in Oberitalien

35/29 *A. germanus* (C.L.Koch, 1837)
as Scorpius Germanus, Fig. 251, Das südliche Tyrol, auch in Oberitalien

35/30 *A. germanus* (C.L.Koch, 1837)
as Scorpius Germanus, Fig. 252, Das südliche Tyrol, auch in Oberitalien

35/31 *Euscorpius aquilejensis* (C.L.Koch, 1837)
as Scorpius Aquilejensis, Fig. 244, Gegend von Triest

35/32 *E. carpathicus* (Linnaeus, 1767)
as Scorpius carpathicus, Fig. 256, Gegenden der Karpathen

35/33 *E. carpathicus* (Linnaeus, 1767)
as Scorpius banaticus, Fig. 679, Südungarn, Banat

35/34 *E. carpathicus* (Linnaeus, 1767)
as Scorpius banaticus, Fig. 680, Südungarn, Banat

35/35 *E. concinnus* (C.L.Koch, 1837)
as Scorpius concinnus, Fig. 246

35/36 *E. flavicaudis* (De Geer, 1778)
as Scorpius Massiliensis, Fig. 237, Gegend von Marseille

35/37 *E. flavicaudis* (De Geer, 1778)
as Scorpius Massiliensis, Fig. 238, Gegend von Marseille

36/1 *E. flavicaudis* (De Geer, 1778)
as Scorpius Massiliensis, Fig. 239, Gegend von Montpellier

36/2 *E. flavicaudis* (De Geer, 1778)
as Scorpius Algeriacus, Fig. 340, Algier

36/3 *E. flavicaudis* (De Geer, 1778)
as Scorpius Algeriacus, Fig. 341, Algier

36/4 *E. italicus* (Herbst, 1800)
as Scorpius Italicus, Fig. 241, Oberitalien, besonders Gegend von Triest

36/5 *E. italicus* (Herbst, 1800)
as Scorpius Italicus, Fig. 242, Oberitalien, besonders Gegend von Triest

36/6 *E. italicus* (Herbst, 1800)
as Scorpius Italicus, Fig. 243, Marseille

36/7 *E. naupliensis* (C.L.Koch, 1837)
as Scorpius Naupliensis, Fig. 240, Griechenland

36/8 *E. naupliensis* (C. L. Koch, 1837)
as Scorpius Naupliensis, Fig. 766, Griechenland

36/9 *E. nicensis* (C.L.Koch, 1841)
as Scorpius nicensis, Fig. 681, Gegend von Nizza

36/10 *E. sicanus* (C.L.Koch, 1837)
as Scorpius Sicanus, Fig. 249, Gegend von Messina

36/11 *E. tauricus* (C.L.Koch, 1837)
as Scorpius tauricus, Fig. 255, Taurien

36/12 *E. tergestinus* (C.L.Koch, 1837)
as Scorpius Tergestinus, Fig. 247, Gegend von Triest

36/13 *E. tergestinus* (C.L.Koch, 1837)
as Scorpius Tergestinus, Fig. 248, Gegend von Triest

36/14 *Scorpius oravitzensis* C. L. Koch, 1842
as Scorpius Oravitzensis, Fig. 765, Ungarn, Gegend von Oravitz im Banat

Vaejovidae

36/15 *Vaejovis asperulus* C. L. Koch, 1842
Fig. 761, Mexico

36/16 *V. carolinus* C. L. Koch, 1842
as Vaejovis Carolinus, Fig. 759, Nordamerika, Carolina

36/17 *V. debilis* C.L.Koch, 1840
Fig. 605, Brasilien

36/18 *V. flavescens* C. L. Koch, 1842
Fig. 760, Brasilien

36/19 *V. mexicanus* C.L.Koch, 1836
Fig. 206, Mexico

36/20 *V. nitidulus* C. L. Koch, 1842
Fig. 758, Mexico

36/21 *V. schuberti* C.L.Koch, 1840
as Vaejovis Schuberti, Fig. 606, Gegend von Konstantinopel

Iuridae

36/22 *Iurus dufourei* (Brullé, 1832)
as Buthus granulatus, Fig. 279

Bothriuridae

36/23 *Thestylus versicolor* (C.L.Koch, 1836)
as Telegonus versicolor, Fig. 207, Brasilien

Hormuridae

36/24 *Chiromachus ochropus* (C.L.Koch, 1837)
as Ischnurus ochropus, Fig. 293

36/25 *Ischnurus complanatus*
family placed by genus, Fig. 295, Java

36/26 *Ischnurus melampus* C. L. Koch, 1842
Fig. 756, Kap der guten Hoffnung

36/27 *Liocheles australasiae* (Fabricius, 1775)
as Ischnurus Australasiae, Fig. 294, Java

Scorpionidae

36/28 *Deccanometrus bengalensis* (C. L. Koch, 1841)
as Buthus Bengalensis, Fig. 696, Ostindien, Bengalen

36/29 *Heterometrus indus* (De Geer, 1778)
as Buthus megacephalus, Fig. 224, Ungewiss, vermuthlich Ostindien

36/30 *H. suammerdami* Simon, 1872
as Buthus Ceylonicus, Fig. 698, Ostindien, Ceylon

36/31 *Javanimetrus cyaneus* (C.L.Koch, 1836)
as Buthus cyaneus, Fig. 225, Java

36/32 *Opisthophthalmus capensis* (Herbst, 1800)
as Opisthophthalmus Capensis, Fig. 308, Das Vorgebirg der guten Hoffnung

36/33 *O. latimanus* C.L.Koch, 1841
Fig. 640, Das Vorgebirg der guten Hoffnung

36/34 *O. maxillosus*
family placed by genus, Fig. 310, Zweifelhaf

36/35 *O. pallipes* C. L. Koch, 1842
Fig. 757, Afrika

36/36 *O. pilosus*
family placed by genus, Fig. 309, Java

36/37 *Pandinus imperator* (C.L.Koch, 1841)
as Buthus afer, Fig. 175, Afrika und Ostindien

37/1 *P. imperator* (C. L. Koch, 1841)
as Buthus Imperator, Fig. 695, Unbekannt

37/2 *Srilankametrus caesar* (C. L. Koch, 1841)
as Buthus Caesar, Fig. 697, Ostindien

PSEUDOSCORPIONES

Chthoniidae

37/3 *Chthonius ischnocheles* (Hermann, 1804)
as Chthonius trombidioides, Fig. 806, Süddeutschland

37/4 *C. ischnocheles* (Hermann, 1804)
as Chthonius trombidioides, Fig. 807, Süddeutschland

37/5 *C. orthodactylus* (Leach, 1817)
Fig. 808, Fingland und Deutschland

Neobisiidae

37/6 *Neobisium carcinoides* (Hermann, 1804)
as Chelifer corticalis, Fig. 154, Gegend um Nürnberg

37/7 *N. carcinoides* (Hermann, 1804)
as Obisium carcinoides, Fig. 798, Die Donaueggenen bei Regensburg

37/8 *N. carcinoides* (Hermann, 1804)
as Obisium Muscorum, Fig. 799, Deutschland

37/9 *N. carcinoides* (Hermann, 1804)
as Obisium tenellum, Fig. 800, Deutschland

37/10 *N. carcinoides* (Hermann, 1804)
as Obisium gracile, Fig. 803, Die Oberpfalz in Baiern

37/11 *N. carcinoides* (Hermann, 1804)
as Obisium gracile, Fig. 804, Die Oberpfalz in Baiern

37/12 *N. fuscimanum* (C. L. Koch, 1843)
as Obisium fuscimanum, Fig. 796, Nicht gehörig bekannt

37/13 *N. sylvaticum* (C. L. Koch, 1835)
as Obisium sylvaticum, Fig. 794, Das südliche Deutschland

37/14 *N. sylvaticum* (C. L. Koch, 1835)
as Obisium sylvaticum, Fig. 795, Das südliche Deutschland

Cheliridiidae

37/15 *Cheliderium museorum* (Leach, 1817)
as Chelifer Muscorum, Fig. 781, Deutschland und England

Chernetidae

37/16 *Allochernes wideri* (C. L. Koch, 1843)
as Chelifer Wideri, Fig. 784, Erlangen

37/17 *Chernes cimicoides* (Fabricius, 1793)
as Chelifer Geoffroyi, Fig. 791, England und Deutschland

37/18 *C. bahnii* (C. L. Koch, 1839)
as Chelifer Hahnii, Fig. 787, Deutschland

37/19 *Dinocheirus panzeri* (C. L. Koch, 1837)
as Chelifer Panzeri, Fig. 782, Um Regensburg

37/20 *D. panzeri* (C. L. Koch, 1837)
as Chelifer Panzeri, Fig. 783, Um Regensburg

37/21 *Pelorus rufimanus* C. L. Koch, 1843
Fig. 793, Brasilien

Cheliferidae

37/22 *Chelifer cancroides* (Linnaeus, 1758)
Fig. 139, In allen Ländern Europas

37/23 *C. cancroides* (Linnaeus, 1758)
as Chelifer granulatus, Fig. 777, Die Gegend von Danzig

37/24 *C. cancroides* (Linnaeus, 1758)
Fig. 780, Deutschland, Frankreich, Schweden und wahrscheinlich ganz Europa

37/25 *C. depressus* C. L. Koch, 1843
Fig. 792, Ungewiss

37/26 *C. fabricii* C. L. Koch, 1835
as Chelifer Fabricii, Fig. 786, Um Regensburg

37/27 *C. grandimanus* C. L. Koch, 1843
Fig. 778, Deutschland

37/28 *C. ixoides*
family placed by genus, Fig. 140, Stadtgraben hiesiger Stadt

- 37/29** *Chelifer ixoides* Hahn, 1834
Fig. 779, Nürnberg
- 37/30** *C. reussii* C. L. Koch, 1843
as *Chelifer Reussii*, Fig. 785
- 37/31** *C. Schaefferi*
family placed by genus, Fig. 790, Deutschland
- 37/32** *Dactylochelifer latreillii* (Leach, 1817)
as *Chelifer Degeeri*, Fig. 788, Um Regensburg
- 37/33** *D. latreillii* (Leach, 1817)
as *Chelifer Degeeri*, Fig. 789, Um Regensburg
- 37/34** *Obisium dubium* C. L. Koch, 1843
Fig. 805, Um Regensburg
- 37/35** *O. dumicola* C. L. Koch, 1835
as *Obisium Dumicola*, Fig. 797, Deutschland
- 37/36** *O. elimatum* C. L. Koch, 1839
Fig. 801, Deutschland
- 37/37** *O. elimatum* C. L. Koch, 1839
Fig. 802, Deutschland

SOLIFUGAE

Galeodidae

- 38/1** *Galeodes arabs* C. L. Koch, 1842
Fig. 1476, Arabien
- 38/2** *G. araneoides* (Pallas, 1772)
Fig. 1475, Südrussland
- 38/3** *G. araneoides* (Pallas, 1772)
Fig. 164, Griechenland
- 38/4** *G. araneoides* (Pallas, 1772)
Fig. 165, Griechenland
- 38/5** *G. intrepidus* Dufour, 1820
Fig. 1479, Aegypten
- 38/6** *G. leucophaeus* C. L. Koch, 1842
Fig. 1478, Arabien
- 38/7** *Paragaleodes scalaris* (C. L. Koch, 1842)
as *Galeodes scalaris*, Fig. 1477

Rhagodidae

- 38/8** *Rhagodeca impavida* (C. L. Koch, 1842)
as *Rhax impavida*, Fig. 1482, Arabien
- 38/9** *Rhagodes furiosus* (C. L. Koch, 1842)
as *Rhax furiosa*, Fig. 1480, Arabien
- 38/10** *Rhax melana*
family placed by genus, Fig. 1481, Aegypten

Hexisopodidae

- 38/11** *Hexisopus lanatus* (C. L. Koch, 1842)
as *Aellopus lanata*, Fig. 1489, Kap der guten Hoffnung

Solpugidae

- 38/12** *Oparbella flavescens* (C. L. Koch, 1842)
as *Solpuga flavescens*, Fig. 1472, Aegypten
- 38/13** *Solpuga badia* C. L. Koch, 1842
Fig. 1469, Kap der guten Hoffnung
- 38/14** *S. hirtuosa* C. L. Koch, 1842
Fig. 1471, Kap der guten Hoffnung
- 38/15** *S. iubata* C. L. Koch, 1842
Fig. 1467, Kap der guten Hoffnung
- 38/16** *S. rufescens* C. L. Koch, 1842
Fig. 1466, Kap der guten Hoffnung
- 38/17** *Solpugema lateralis* (C. L. Koch, 1842)
as *Solpuga lateralis*, Fig. 1474, Kap der guten Hoffnung
- 38/18** *S. vincta* (C. L. Koch, 1842)
as *Solpuga vincta*, Fig. 1468, Kap der guten Hoffnung
- 38/19** *Solpugiba lineata* (C. L. Koch, 1842)
as *Solpuga lineata*, Fig. 1473, Kap der guten Hoffnung
- 38/20** *Zeria fusca* (C. L. Koch, 1842)
as *Solpuga fusca*, Fig. 1470, Kap der guten Hoffnung
- 38/21** *Z. lethalis* (C. L. Koch, 1842)
as *Solpuga letalis*, Fig. 1465, Kap der guten Hoffnung

Daesiidae

- 38/22** *Gluvia cinerascens* C. L. Koch, 1842
Fig. 1484, Mexiko
- 38/23** *G. formicaria* C. L. Koch, 1842
Fig. 1487, Mexiko
- 38/24** *G. gracilis* C. L. Koch, 1842
Fig. 1485, Columbien
- 38/25** *G. praecox* C. L. Koch, 1842
Fig. 1483, Mexiko
- 38/26** *G. striolata* C. L. Koch, 1842
Fig. 1488, Portugal

Ammotrechidae

- 38/27** *Ammotrechella geniculata* (C. L. Koch, 1842)
as *Gluvia geniculata*, Fig. 1486, Südamerika, in den Gegenden des Orinoko

OPILIONES

Trogulidae

- 38/28** *Trogulus closanicus* Avram, 1971
as *Trogulus asperatus*, Fig. 428, Bei Zweibrücken in der bayerischen Provinz, die Pfalz genannt
- 38/29** *T. coreiformis* C. L. Koch, 1839
Fig. 422, ungewiss
- 38/30** *T. coriziformis* C. L. Koch, 1839
Fig. 420, ?

- 38/31** *Trogulus lygaeiformis* C. L. Koch, 1839
Fig. 421, Griechenland
- 38/32** *T. melanotarsus*
Fig. 429, Deutschland und Frankreich
- 38/33** *T. nepaeformis* (Scopoli, 1763)
Fig. 423, Frankreich (nach Latreille, unter Steinen)
- 38/34** *T. nepaeformis* (Scopoli, 1763)
as *Trogulus niger*, Fig. 424, Jenseits der Alpen, vermuthlich Gegend von Triest
- 38/35** *T. nepaeformis* (Scopoli, 1763)
as *Trogulus nepiformis*, Fig. 97, Deutschland und Frankreich
- 38/36** *T. squamatus* C. L. Koch, 1839
Fig. 425, Dalmatien
- 38/37** *T. tingiformis* C. L. Koch, 1847
Fig. 1546, Oberbayern
- 39/1** *T. tricarinatus* (Linnaeus, 1767)
as *Trogulus squalidus*, Fig. 426, Deutschland
- 39/2** *T. tricarinatus* (Linnaeus, 1767)
Fig. 427, Deutschland

Nemastomatidae

- 39/3** *Mediostoma humerale* (C. L. Koch, 1839)
as *Nemastoma humerale*, Fig. 1544, Griechenland
- 39/4** *Nemastoma bimaculatum* (Fabricius, 1775)
Fig. 223, England und Deutschland
- 39/5** *N. triste* (C. L. Koch, 1835)
Fig. 1542, Baiern, Oberpfalz, Gegend von Regensburg
- 39/6** *Paranemastoma bicuspidatum* (C.L.Koch, 1834)
as *Nemastoma bicuspidatum*, Fig. 222, Oberhalb dem Rade Gastein im Salzburgischen
- 39/7** *P. quadripunctatum* (Perty, 1833)
as *Nemastoma flavimanum*, Fig. 1543, Südliches Deutschland jenseits der Alpen, Oberpfalz

Ischyropsalididae

- 39/8** *Ischyropsalis hellwigii* (Panzer, 1793)
as *Ischyropsalis Helwigii*, Fig. 603, Bayern, Unterfränkischer Kreis
- 39/9** *I. hellwigii* (Panzer, 1793)
as *Phalangium Helwigii*, Fig. 96, Deutschland
- 39/10** *I. Herbstii*
family placed by genus, Fig. 1545, Krain
- 39/11** *I. kollari* C.L.Koch, 1839
as *Ischyropsalis Kollari*, Fig. 604, Gegend von Gastein

Phalangiidae

- 39/12** *Egaenus convexus* (C. L. Koch, 1835)
Fig. 1490, Das südliche Deutschland jenseits der Alpen
- 39/13** *E. convexus* (C. L. Koch, 1835)
as *Egaenus ictericus*, Fig. 1491, Das südliche Deutschland jenseits der Alpen
- 39/14** *E. convexus* (C. L. Koch, 1835)
as *Egaenus tibialis*, Fig. 430, Unbekannt
- 39/15** *Graecophalangium militare* (C. L. Koch, 1839)
as *Opilio militaris*, Fig. 1530, Griechenland
- 39/16** *Lacinius dentiger* (C. L. Koch, 1847)
as *Acantholophus dentiger*, Fig. 1498, Oesterreich und Bajern
- 39/17** *L. ephippiatus* (C. L. Koch, 1835)
as *Acantholophus ephippiatus*, Fig. 1501, Kärnthen, Krain und Böhmen
- 39/18** *L. ephippiatus* (C. L. Koch, 1835)
as *Acantholophus ephippiatus*, Fig. 1502, Kärnthen, Krain und Böhmen
- 39/19** *L. horridus* (Panzer, 1794)
as *Acantholophus hispidus*, Fig. 1496, Deutschland
- 39/20** *L. horridus* (Panzer, 1794)
as *Acantholophus hispidus*, Fig. 1497, Deutschland
- 39/21** *L. horridus* (Panzer, 1794)
as *Acantholophus horridus*, Fig. 1499, Deutschland
- 39/22** *Lophopilio palpinalis* (Herbst, 1799)
as *Acantholophus spinulosus*, Fig. 1500, Deutschland und Frankreich
- 39/23** *L. palpinalis* (Herbst, 1799)
as *Opilio terricola*, Fig. 204, Bayerische Oberpfalz
- 39/24** *Metaphalangium cirtanum* (C. L. Koch, 1839)
as *Opilio Cirtanus*, Fig. 1531, Algier
- 39/25** *M. cirtanum* (C. L. Koch, 1839)
as *Opilio luridus*, Fig. 1534
- 39/26** *Metaplathybunus grandissimus* (C. L. Koch, 1839)
as *Platylophus grandissimus*, Fig. 1505, Griechenland
- 39/27** *M. obliquus* (C. L. Koch, 1839)
as *Opilio obliquus*, Fig. 1524, Griechenland
- 39/28** *Mitopus glacialis* (Heer, 1845)
as *Opilio glacialis*, Fig. 1533, Schweizeralpen
- 39/29** *M. morio* (Fabricius, 1779)
as *Opilio alpinus*, Fig. 1515, Wahrscheinlich in allen Alpen, worin *Rhododendron* vorkommt
- 39/30** *M. morio* (Fabricius, 1779)
as *Opilio fasciatus*, Fig. 1516, Das südliche Deutschland jenseits der Alpen
- 39/31** *M. morio* (Fabricius, 1779)
as *Opilio grossipes*, Fig. 1519, Deutschland, Frankreich
- 39/32** *M. morio* (Fabricius, 1779)
as *Opilio cinerascens*, Fig. 1521, Hochlande von Oberbaiern
- 39/33** *M. morio* (Fabricius, 1779)
as *Opilio canescens*, Fig. 1522, Baiern, in den Gebirgen der Hochlande

- 39/34** *Mitopus morio* (Fabricius, 1779)
as *Opilio albesens*, Fig. 1525, Oberpfalz, auch Böhmen
- 39/35** *M. morio* (Fabricius, 1779)
as *Opilio serripes*, Fig. 1527, Baiern
- 39/36** *M. morio* (Fabricius, 1779)
as *Opilio similis*, Fig. 1528, Baiern
- 39/37** *M. morio* (Fabricius, 1779)
as *Opilio affinis*, Fig. 1529, Bayern
- 40/1** *M. morio* (Fabricius, 1779)
as *Opilio cryptarum*, Fig. 205, Wildbad Gastein im Salzburgischen
- 40/2** *Oligolophus tridens* (C.L.Koch, 1836)
as *Opilio fridens*, Fig. 173, Wahrscheinlich ganz Süddeutschland
- 40/3** *Opilio corniger*
family placed by genus, Fig. 235, Hiesige Gegend (Vor- und Feldhölzer)
- 40/4** *O. corniger*
family placed by genus, Fig. 236, Hiesige Gegend (Vor- und Feldhölzer)
- 40/5** *O. fuscatus*
family placed by genus, Fig. 1523, Baiern, in den Donaugegenden
- 40/6** *O. parietinus* (De Geer, 1778)
Fig. 1513, Europa
- 40/7** *O. parietinus* (De Geer, 1778)
Fig. 1514, Europa
- 40/8** *O. parietinus* (De Geer, 1778)
as *Opilio leucophaeus*, Fig. 1520, Baiern
- 40/9** *O. parietinus* (De Geer, 1778)
as *Phalangium longipes*, Fig. 162, Deutschland, Frankreich, Schweden
- 40/10** *O. saxatilis* C. L. Koch, 1839
Fig. 1517, In hiesiger Gegend in den Niederungen gegen die Donau hin
- 40/11** *O. saxatilis* C. L. Koch, 1839
Fig. 1518, In hiesiger Gegend in den Niederungen gegen die Donau hin
- 40/12** *Phalangium hispidum*
family placed by genus, Fig. 163, Deutschland
- 40/13** *P. opilio* Linnaeus, 1758
as *Cerastoma curvicone*, Fig. 1507, Deutschland
- 40/14** *P. opilio* Linnaeus, 1758
as *Cerastoma curvicone*, Fig. 1508, Deutschland
- 40/15** *P. opilio* Linnaeus, 1758
as *Cerastoma cornutum*, Fig. 1509, Europa
- 40/16** *P. opilio* Linnaeus, 1758
as *Cerastoma cornutum*, Fig. 1510, Europa
- 40/17** *P. opilio* Linnaeus, 1758
as *Cerastoma brevicorne*, Fig. 1511, Deutschland
- 40/18** *P. opilio* Linnaeus, 1758
as *Cerastoma brevicorne*, Fig. 1512, Deutschland
- 40/19** *P. opilio* Linnaeus, 1758
Fig. 160, Beinahe in allen Ländern Europas
- 40/20** *P. opilio* Linnaeus, 1758
as *Phalangium cornutum*, Fig. 161, In mehreren Ländern Europas
- 40/21** *Platybunus bucephalus* (C. L. Koch, 1835)
as *Platylophus Bucephalus*, Fig. 1504, Triest, jenseits der Alpen
- 40/22** *P. bucephalus* (C.L.Koch, 1835)
as *Opilio rufipes*, Fig. 174, Deutschland
- 40/23** *P. incanus* C. L. Koch, 1839
Fig. 1494, Bajern, Oberpfalz
- 40/24** *P. pinetorum* (C. L. Koch, 1839)
as *Platylophus Pinetorum*, Fig. 1503, In hiesiger Gegend und in der Oberpfalz
- 40/25** *P. pinetorum* (C. L. Koch, 1839)
as *Platylophus alpestris*, Fig. 1506, Bayern
- 40/26** *Rilaena triangularis* (Herbst, 1799)
as *Platybunus denticornis*, Fig. 1495, In hiesiger Gegend
- 40/27** *R. triangularis* (Herbst, 1799)
as *Opilio rufescens*, Fig. 1526, Baiern, in den Gebirgen der Hochlande
- 40/28** *R. triangularis* (Herbst, 1799)
as *Opilio lucorum*, Fig. 188, Deutschland
- 40/29** *R. triangularis* (Herbst, 1799)
as *Opilio lucorum*, Fig. 189, Deutschland
- 40/30** *Zachaeus crista* (Brullé, 1832)
as *Zachaeus mordax*, Fig. 1492, Griechenland
- 40/31** *Z. crista* (Brullé, 1832)
as *Zachaeus mordax*, Fig. 431, Griechenland

Sclerosomatidae

- 40/32** *Gyas annulatus* (Olivier, 1791)
as *Opilio nigricans*, Fig. 1532, Gegend von Laibach (Krain)
- 40/33** *Homalenotus monoceros* C. L. Koch, 1839
Fig. 1493, Unbekannt
- 40/34** *Leiobunum bicolor*
family placed by genus, Fig. 1538, Deutschland, Schweiz
- 40/35** *L. roseum* C. L. Koch, 1839
Fig. 1539, Gegend von Laibach und Triest
- 40/36** *L. rotundum* (Latreille, 1798)
as *Leiobunum hemisphaericum*, Fig. 1535, Deutschland und Frankreich

- 40/37 *Leiobunum rotundum* (Latreille, 1798)
as Leiobunum hemisphaericum, Fig. 1536, Deutschland und Frankreich
- 41/1 *L. rotundum* (Latreille, 1798)
as Leiobunum hemisphaericum, Fig. 1537, Deutschland und Frankreich
- 41/2 *L. rupestre* (Herbst, 1799)
as Leiobunum ovale, Fig. 1540, Gegend von Laibach, Krain
- 41/3 *Syleus niger* (C. L. Koch, 1839)
as Acanthotus niger, Fig. 1541, Ostindien

Cosmetidae

- 41/4 *Cosmetus varius* Perty, 1833
Fig. 586, Brasilien
- 41/5 *C. varius* Perty, 1833
as Cosmetus mesacanthus, Fig. 587, Brasilien
- 41/6 *Cynorta conspersa* (Perty, 1833)
Fig. 582, Brasilien
- 41/7 *Cynortellana lagenaria* (Perty, 1833)
as Cynorta lagenaria, Fig. 583, Brasilien
- 41/8 *Flirtea phalerata*
Fig. 591, Brasilien
- 41/9 *F. picta* (Perty, 1833)
Fig. 581, Brasilien
- 41/10 *Gnidia bipunctata* (Perty, 1833)
Fig. 579, Brasilien
- 41/11 *Pacilaema andreae* (Perty, 1833)
as Flirtea Andreae, Fig. 580, Brasilien
- 41/12 *P. marginale*
Fig. 589, Brasilien
- 41/13 *P. marginale*
Fig. 590, Brasilien
- 41/14 *P. u-flavum* (Perty, 1833)
as Pacilaema U-flavum, Fig. 584, Brasilien
- 41/15 *P. u-flavum* (Perty, 1833)
as Pacilaema limbatum, Fig. 585, Brasilien
- 41/16 *Sibambee cincta* (Perty, 1833)
as Discosoma cinctum, Fig. 588, Brasilien

Gonyleptidae

- 41/17 *Ampheres asper*
Fig. 570
- 41/18 *A. spinipes*
Fig. 571, Brasilien
- 41/19 *Arthrodes xanthopygus* Koch, 1839
as Caelopygus macrocanthus, Fig. 574, Brasilien
- 41/20 *A. xanthopygus* Koch, 1839
Fig. 577, Brasilien
- 41/21 *Asarcus longipes* Koch, 1839
Fig. 569, Brasilien
- 41/22 *Caelopygus curvispina*
Fig. 573, Brasilien
- 41/23 *C. elegans* (Perty, 1833)
Fig. 576, Brasilien
- 41/24 *C. melanocephalus* Koch, 1839
Fig. 575, Brasilien
- 41/25 *Delrigalus curvispina* (Perty, 1833)
as Gonyleptes curvispinosus, Fig. 555, Brasilien
- 41/26 *Eusarcus armatus* Perty, 1833
Fig. 541, Brasilien
- 41/27 *E. armatus* Perty, 1833
Fig. 542, Brasilien
- 41/28 *E. oxyacanthus* Koch, 1839
Fig. 543, Brasilien
- 41/29 *E. oxyacanthus* Koch, 1839
Fig. 544, Brasilien
- 41/30 *Goniosoma dentipes* Koch, 1839
Fig. 565, Brasilien
- 41/31 *G. dentipes* Koch, 1839
as Goniosoma grossum, Fig. 566, Brasilien
- 41/32 *G. roridum* Perty, 1833
Fig. 594, Brasilien
- 41/33 *G. varium* Perty, 1833
Fig. 562, Brasilien
- 41/34 *G. varium* Perty, 1833
Fig. 563, Brasilien
- 41/35 *G. varium* Perty, 1833
as Goniosoma patrule, Fig. 593, Brasilien
- 41/36 *G. vatrax* C. L. Koch, 1845
Fig. 970, Brasilien
- 41/37 *G. venustum* Koch, 1839
Fig. 567, Brasilien
- 42/1 *G. versicolor* Perty, 1833
Fig. 564, Brasilien
- 42/2 *Gonyleptes horridus* Kirby, 1819
Fig. 551, Brasilien
- 42/3 *G. horridus* Kirby, 1819
Fig. 552, Brasilien
- 42/4 *G. horridus* Kirby, 1819
as Gonyleptes bicuspidatus, Fig. 556, Brasilien
- 42/5 *G. muticus*
family placed by genus, Fig. 557, Brasilien
- 42/6 *G. pectinatus* C. L. Koch, 1845
Fig. 971, Brasilien, Bahia

- 42/7 *Graphinotus ornatus* Koch, 1839
Fig. 545, Brasilien
- 42/8 *Leptocnemus sulphureus* (Perty, 1833)
Fig. 578, Brasilien
- 42/9 *Metamitobates squalidus* (Perty, 1833)
as Ancistrotus squalidus, Fig. 558, Brasilien
- 42/10 *Mischonyx scaber* (Kirby, 1819)
as Gonyleptes scaber, Fig. 553, Brasilien
- 42/11 *M. scaber* (Kirby, 1819)
as Gonyleptes scaber, Fig. 554, Brasilien
- 42/12 *Mitobates triangulus* Sundevall, 1833
as Ancistrotus conspersus, Fig. 561, Brasilien
- 42/13 *Mitogoniella badia* (Koch, 1839)
as Goniosoma badium, Fig. 568, Brasilien
- 42/14 *M. modesta* (Perty, 1833)
as Goniosoma modestum, Fig. 592, Brasilien
- 42/15 *Neoancistrotus bifurcatus* (Koch, 1839)
as Ancistrotus bifurcatus, Fig. 559, Brasilien
- 42/16 *Ostracidium decoratum* Koch, 1839
family placed by genus, Fig. 546, Brasilien
- 42/17 *Pachylus chilensis* (Gray, 1833)
as Pachylus granulatus, Fig. 548, Chili?
- 42/18 *Pristocnemus pustulatus* Koch, 1839
Fig. 547, Brasilien
- 42/19 *Proampheres serratus* (Koch, 1839)
as Ampheres serratus, Fig. 572, Brasilien
- 42/20 *Promitobates hexacanthus* (Koch, 1839)
as Ancistrotus hexacanthus, Fig. 560, Brasilien

Stygidae

- 42/21 *Stygnoplus forcipatus* (C. L. Koch, 1845)
as Stygnus forcipatus, Fig. 969, Columbien
- 42/22 *S. triacanthus* (Koch, 1839)
as Stygnus triaca, Fig. 549, Südamerika
- 42/23 *Stygnus ferrugineus* (Perty, 1833)
Fig. 550, Brasilien

ACARI

Ixodidae

- 42/24 *Dermacentor marginatus* (Sulzer, 1776)
as Ixodes marginatus, Fig. 153, Hiesige Gegend
- 42/25 *Ixodes ricinus* (Linnaeus, 1758)
as Ixodes reduvius, Fig. 152, Europa

Trombidiidae

- 42/26 *Trombidium fasciculatum*
family placed by genus, Fig. 17, Java
- 42/27 *T. fuliginosum*
family placed by genus, Fig. 19, Frankreich und Deutschland
- 42/28 *T. holosericeum*
Fig. 18, Ganz Europa
- 42/29 *T. muscosum*
family placed by genus, Fig. 156, Hiesige Gegend

Erythraeidae

- 42/30 *Erythraeus phalangioides*
Fig. 20, Deutschland und Frankreich
- 42/31 *Leptus trimaculatus* (Rossi, 1794)
as Trombidium trimaculatum, Fig. 155, Deutschland, um Strassburg

Limnocharidae

- 42/32 *Limnochaeres aquatica*
as Limnochaeres holosericea, Fig. 21, Ganz Europa

Hydrachnidae

- 42/33 *Hydrachna geographica* O.F.Müller, 1776
Fig. 134, Europa
- 42/34 *H. globulus*
family placed by genus, Fig. 137
- 42/35 *H. histriónica*
family placed by genus, Fig. 135, Deutschland und Frankreich
- 42/36 *H. miniata*
family placed by genus, Fig. 136, Nürnberger Gegend
- 42/37 *H. variipes*
family placed by genus, Fig. 138, Hiesige Umgegend